



500 mg/impregnált csík mézelő méhek részére A.U.V.

Anagyszerű csík



Egyszerű és nagyszerű!



A készítmény jellemzői

- Amitrázra érzékeny Varroa destructor okozta fertőzöttség kezelésére.
- Élmezés-egészségügyi várakozási idő: 0 nap
- Füstölés nélkül alkalmazható
- Biztonságos termék
- Nagyobb érintkezési felület
- A hatóanyag magas hasznosulása
- Ideális csíkméretek

- Ideális Layens, Langstroth és Dandantkaptár esetében is.


- Alegnagyobb felületű készítmény a piacon, ezáltal nagyobb kontaktfelületet biztosít a méhek számára.

- Kitűnően illeszkedik - tartófülekkel rögzíthető a keretek közé. A fennmaradó légtér a méhek számára megkönnyíti a kontaktust.

- “Plug and Play”
Azonnali felhasználásra kész, nem igényel előkészítést!

Hatóanyag - AMITRAZ

- Magas hatóanyag, amely 99%-os hatékonyságot mutat a Varroa atkákkal szemben
- Magas hatékonyság
- Kiváló dózis-hatékonysági arány
- Emberi fogyasztásra kerülő méz gyűjtésének időszakában nem alkalmazható
- Nincs reziduum a mézben vagy a méhviaszban



A fotót készítette Luis Miguel Gallardo



500 mg/impregnált csík mézelő méhek részére A.U.V.

Apitraz 500 mg/impregnált csík mézelő méhek részére A.U.V.

Összetétel: Egy csík 500 mg Amitrázt tartalmaz.

Terápiás javallatok: Varroa destructor okozta fertőzöttség gyógykezelésére

Célállatfaj: Mézelő méh (Apis mellifera)

Adagolás és alkalmazás módja: Méhkaptárban való alkalmazásra. Kaptáranként 2 csík (azaz 1g amitráz/kaptár) használandó. Az impregnált csíkokat a keretek közé kell helyezni, a fészektérben vagy a méhcsoportok közötti, legalább két keret távolságra a csíkok között. A csíkokat azon keretek közé kell tenni, ahol a méhek a legnagyobb mozgást tanúsítják. A csíkokat úgy kell felfüggeszteni, hogy a méhek szabadon megközelíthessék a csík mindkét oldalát, miközben marad egy minimális tér a méhek számára. Kaptártípusok: Dadant típusú kaptárak esetében egy csíkot a harmadik és negyedik keret közé, és egyet a hetedik és nyolcadik keret közé kell helyezni. Layens típusú kaptárak esetében egy csíkot kell helyezni az ötödik és hatodik keret közé, és egyet a kilencedik és tizedik közé.

Helyes alkalmazásra való útmutatás: Fiasítás hiányában, vagy ha a fiasítás mennyisége a legalacsonyabb szinten van, a csíkokat 6 hetes kezelés után el lehet távolítani. Fiasítás esetén csak 10 hetes kezelés után szabad eltávolítani. A csíkokat át kell helyezni a méhcsoport vagy a fészektér változása esetén. A kezelés ajánlott ideje, amikor a mézes keretek nincsenek jelen az utolsó mézszüret után és a tavaszi mézgyűjtő időszak előtt. A készítmény alkalmazása előtt figyelembe kell venni a fedett fiasítási szintet, valamint az adott földrajzi egységnek megfelelő időjárási viszonyokat.

Élmezés-egészségügyi várakozási idő: Méz: nulla nap. Emberi fogyasztásra kerülő méz gyűjtésének időszakában nem alkalmazható.

Kizárólag állatorvosi vényre kiadható állatgyógyászati 3710/1/16, 3710/2/16 NÉBIH ÁTI
A készítmény forgalombahozatali engedély száma: 3710/116

