




DFV DOXIVET 500 mg/g

Por ivóvízbe keveréshez,
sertések és házityúk számára A.U.V.

Magas minőségű,
50%-os koncentrációjú doxiciklin,
kiváló stabilitással



Animal health and welfare



DFV DOXIVET 500 mg/g
Por ivóvízbe keveréshez,
sertések és házi tyúkok számára A.U.V.

DFV Doxivet 500 mg/g = koncentrált formula, citromsavval.

A doxiciklin egy bakteriosztatikus hatású antimikrobiális szer, amely a tetraciklinek csoportjába tartozik. A doxiciklin a bakteriális riboszómák 30S alegységéhez kötődik, gátolva a bakteriális fehérjeszintézist.

Más tetraciklinekhez képest, a doxiciklin:

- 1** Fokozott bélrendszeri felszívódással rendelkezik, amely biztosítja a vízben keresztül alkalmazott dózis tökéletes hasznosulását.
- 2** Csökkentett kelátképző hajlama lehetővé teszi a készítmény alkalmazását bármilyen minőségű ivóvízben.
- 3** Magasabb kötődési affinitás a plazmafehérjékhez, amely hosszabb plazma felezési időt eredményez.
- 4** Jobb lipofil tulajdonság, mely elősegíti a hatóanyag jobb bejutását az érintett szövetekbe/sejtekbe.

A doxiciklin ivóvízben történő oldhatóságának köszönhetően kényelmesen alkalmazható sertések és házi tyúkok számára, elsősorban légúti infekciók kezelésére javallt készítmény.

Doxiciklin-hiklát 500 mg/g.

- Ideális kiszerelés és koncentráció nagyobb gazdaságok számára.
- Kisebb környezeti hatás (kevesebb csomagolóanyag-hulladék).

DFV Doxivet 500 mg/g: koncentrált formula, citromsavval.


- DFV Doxivet 500 mg/g citromsavat tartalmaz segédanyagként.
- A citromsav megakadályozza a doxiciklin gyors lebomlását a vízbekeverést követően.
- Más doxiciklinek egyéb olyan segédanyagot tartalmaznak (pl. laktózt) mely nem akadályozza meg a doxiciklin vízben történő lebomlását.

DFV Doxivet 500 mg/g:
Magas hatékonyság
hosszú időn keresztül az
ivóvízbe keverést követően.

DFV Doxivet 500 mg/g: **a készítmény stabilitása garantált** **bármilyen minőségű ivóvízben.**

- Alkalmas lágy és kemény ivóvízben történő alkalmazásra.
- 24 órás magas stabilitás vízben való feloldást követően.

DFV DOXIVET 500 mg/g: stabilitás a vízben feloldást követő 24 órában $\geq 96.2\%$.



Hosszú felhasználhatósági idő.

- 2 év a gyártási időtől számítva.
- 12 hó az első felbontástól.
- 24 óra vízben feloldását követően, bármilyen minőségű ivóvízben feloldva.

Jobb eltarthatóság.

- Nem igényel speciális tárolási körülményeket.
- A fény nincs hatással a készítmény tulajdonságaira.
- Nem igényel különleges tárolási hőmérsékletet.

DFV Doxivet 500 mg/g
nem igényel különleges
tárolási körülményeket.

DFV DOXIVET 500 mg/g stabilitása vízben:

- A készítmény nem veszít a hatékonyságából vízben történő feloldást követően sem.
- Hosszútávon biztosítja a megfelelő adagolást.

Kiváló vízoldékonyság

- A javasolt dózis 500-szorosa is feloldódik.
- Nincs kicsapódás.
- Alacsony hőmérsékleten sincs oldhatósági probléma.

Könnyen és gyorsan oldódik fel vízben.

Nincs kicsapódás:

- Egyszerűbb adagolhatóság.
- Nem képez az itatóberendezés csöveiben lerakódást és megakadályozza a szopókák elzáródását.
- Csökkenti más készítményekkel történő kölcsönhatások kockázatát.

Javallatok, adagolás, és ételmezés-egészségügyi várakozási idő.



Sertés

Javallatok:

Doxiciklinre érzékeny *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* és *Mycoplasma hyopneumoniae* törzsek okozta légúti fertőzésekhez kapcsolódó klinikai tünetek kezelésére.

Adagolás:

0.25 g/liter (*) víz/nap.

4 egymást követő napon át = (12.5 mg doxiciklin-híklát/ttkg.)

Ételmezés-egészségügyi várakozási idő:

Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap.



Házityúk

Javallatok:

Ha a betegségnek az állományban való jelenléte igazolt, a mortalitás, a morbiditás, a klinikai tünetek és a gyulladásos léziók számának csökkentésére *Pasteurella multocida* okozta pasteurellózis esetében, valamint a morbiditás és a léziók számának csökkentésére *Ornithobacterium rhinotracheale* (ORT) okozta légúti fertőzések esetén.

Adagolás:

- Pasteurellózis 0.1 g/liter (*) víz/nap.

3-4 egymást követő napon át. (10 mg doxiciklin-híklát/ttkg.)

- ORT-fertőzés: 0.2 g/liter (*) víz/nap.

3-4 egymást követő napon át. (20 mg doxiciklin-híklát/ttkg.)


Ételmezés-egészségügyi várakozási idő:

Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap (10 mg/ttkg. dózissal).

Hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap (20 mg/ttkg. dózissal).

Már 3 napos kezelés is elegendő lehet (Házityúkok esetén). Rövid ételmezés-egészségügyi várakozás idő. Házityúk esetén többféle dózisban is alkalmazható (10 – 20 mg/ttkg).

(*) Javasolt adagolás a napi vízfogyasztástól függ.



DFV DOXIVET 500 mg/g

Por ivóvízbe keveréshez,
sertések és házityúk számára A.U.V.

Magas minőségű, 50%-os koncentrációjú doxiciklin, kiváló stabilitással

- Citromsavat tartalmaz, amely megakadályozza a doxiciklin lebomlását vízbe keverés után.
- Kiváló stabilitás.
- Kiváló oldhatóság.
- Hosszú eltarthatóság.
- Rövid kezelés: 3 nap elegendő lehet (házityúk esetén).
- Ideális koncentráció és kiszerelés.



DFV DOXIVET 500 mg/g, por ivóvízbe keveréshez sertések és házityúk számára A.U.V.. **ÖSSZETÉTEL:** 1g por 500 mg doxiciklin-hiklátot tartalmaz, ami 433 mg doxiciklin bázisnak felel meg. Segédanyagok a szükséges mennyiségben. **CÉLÁLLATOK:** Sertések és házityúk (brojler, jérce, szülőpár). **JAVALLATOK:** Sertések: Doxiciklinre érzékeny *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* és *Mycoplasma hyopneumoniae* törzsek okozta légúti fertőzésekhez kapcsolódó klinikai tünetek kezelésére. Házityúk: Ha a betegségnek az állományban való jelenléte igazolt, a mortalitás, a morbiditás, a klinikai tünetek és a gyulladásos léziók számának csökkentésére *Pasteurella multocida* okozta pasteurellózis esetében, valamint a morbiditás és a léziók számának csökkentésére *Ornithobacterium rhinotracheale* (ORT) okozta légúti fertőzések esetén. **ADAGOLÁS:** Szájon át ivóvízbe keverve alkalmazandó. Javasolt dózis sertésnél: Naponta 12,5 mg doxiciklin-hiklát (25 mg készítmény) testtömeg kilogrammonként, 4 egymást követő napon át. Ha ezen az időtartamon belül a klinikai tünetek nem javulnak, a diagnózis felülvizsgálatára és a kezelés módosítására van szükség. Súlyos fertőzés esetén a gyógyszeres kezelés időtartama legfeljebb 8 egymást követő napra növelhető, a kezelő állatorvos döntése szerint. Javasolt dózis házityúknál: Naponta 10 mg doxiciklin-hiklát (20 mg készítmény) testtömeg kilogrammonként, 3-4 egymást követő napon át *P. multocida* okozta fertőzés esetén, és 20 mg doxiciklin-hiklát (40 mg készítmény) testtömeg kilogrammonként naponta, 3-4 egymást követő napon át *O. rhinotracheale* okozta fertőzés esetén. **ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ:** Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap. Házityúk: Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap, 4 napon át adott 10 mg/testtömeg kg dózist követően. Hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap, 4 napon át adott 20 mg/testtömeg kg dózist követően. Tojás: A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojást termelő madarak kezelésére nem engedélyezett. Nem alkalmazható a tojásrakás várható kezdete előtti 4 hétben. **FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐ:** A forgalomba hozott állatgyógyászati készítmény eltarthatósági ideje: 2 év. Az első felbontást követően: 12 hónap, a készítmény lejáratí idején belül felhasználva. Az előírás szerinti feloldás után felhasználható: 24 órával az ivóvízben történt feloldás után. **KISZERELÉS:** Doboz: 10x100g; 50x100g; 250x100g; Tasak: 1kg; 2,5kg. **A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME:** A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: DIVASA-FARMAVIC S.A. Ctra. Sant Hipòlit, km 71, 08503 Gurb-Vic, Barcelona (Spanyolország).

DIVASA-FARMAVIC, S.A. (DFV®)
Ctra. Sant Hipòlit, Km 71
08503 Gurb | Vic | Barcelona | Spain
www.divasa-farmavic.com

