

A close-up photograph of a brown bison head with large, curved, light-colored horns. The bison is looking directly at the camera with a serious expression. The background is dark and out of focus.

DUNAVET

TERMÉKKATALÓGUS
2026

TARTALOMJEGYZÉK

GYÓGYPREMIXEK

AIVLOSIN 42,5 mg/g gyógypremix sertések részére	20
BIOTILINA 100 mg/g sertések és házinyulak részére A.U.V.....	22
DOXYPREX 100 mg/g gyógypremix sertéseknek A.U.V.....	24
RHEMOX PREMIX 100 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V. ...	26
SULFAPREX 250/50 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V.	28
ZOBIOTIC GLOBULIT 150 mg/l gyógypremix A.U.V.....	30

VÍZOLDÉKONY ANTIBIOTIKUMOK (Belsőlegesen porok, oldatok)

AIVLOSIN 625 mg/g granulátum ivóvízbe keveréshez házityúk és pulykák részére	34
AIVLOSIN 625 mg/g granulátum ivóvízbe keveréshez sertések részére.....	36
AMOTRIX 800 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések részére A.U.V.	38
DFV DOXYVET 500 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertés és házityúk számára A.U.V.	40
GANADEXIL ENROFLOXACINA 100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez házityúknak A.U.V.....	42
NIPOXYME 200 mg/g szuszpenzió ivóvízbe keveréshez A.U.V.	44

OCNIL 400 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések és házityúk részére A.U.V.	46
RHEMOX 500 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések, házityúk, kacsák és pulykák számára	48
TIATRIX 450 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések és házityúk részére A.U.V.	50

INJEKCIÓS ANTIBIOTIKUMOK

BOFLOX 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	54
EFICUR 50 mg/ml injekció sertések és szarvasmarhák részére A.U.V.	56
FLOGANE 300 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	58
GENTAMOX injekció A.U.V.....	60
QIVITAN 25 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarhák és sertések részére	62
ROXACIN 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	64
SELECTAN 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	66
TULLAVIS 25 mg/ml oldatos injekció sertések számára A.U.V.....	68
TULLAVIS 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok számára A.U.V.	70

VETDRAX 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok számára A.U.V.	72
--	----

VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK (Szájon át adható)

BETAMINT oldat valamennyi állatfaj részére.....	76
CHICKTONIC folyékony kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj részére	78
DUNAVIT-C 100% pulvis valamennyi állatfaj részére.....	80
ESVEX folyékony premix valamennyi állatfaj részére.....	82
POLIVIT AMINOACIDOS LIQUIDO folyékony kiegészítő takarmány	84
POLIVIT B COMPLEX + AD₃E folyékony takarmány előkeverék.....	86
PROMOTOR 43 por alakú kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj részére	88
PROMOTOR L 47.0 folyékony kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj részére	90

INJEKCIÓS VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK

DALMAFORT 15mg/ml + 18.22 mg/ml emulziós injekció sertések és szarvasmarhák részére.....	94
ESVEX injekció A.U.V.	96

METABOLASE injekció szarvasmarha, bivaly, ló, sertés, juh, kecske, nyulak, kutya és macska részére	98
---	----

TOCO SELENIO oldatos injekció.....	100
UNIFERON 200 mg/ml oldatos injekció malacok részére A.U.V.....	102
VIGOPHOS 100 mg/ml +0,05 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák részére.....	104

SZARVASMARHA TŐGYINFÚZIÓK ÉS MÉHKEZELŐ SZEREK

FATROSEAL intramammális szuszpenzió szárazon álló tehenek számára	108
FATROXIMIN DC 100 mg/5 ml intramammális kenőcs szarvasmarhák és bivalyok részére A.U.V.	110
FATROXIMIN IU 100 mg/13,4 g intrauterin emulzió szarvasmarhák és lovak részére A.U.V.	112
MASTINATON 750 mg/5 g intramammális gél tejelő teheneknek A.U.V.	114
PENETHAONE 236,3 mg/ml por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz, szarvasmarhák számára.....	116
QIVITAN LC 75 mg intramammális kenőcs tejelő tehenek részére A.U.V. ...	118
UTERTAB 2000 mg méhtabletta szarvasmarhák részére A.U.V.	120

SERTÉS VAKCINÁK

ERYSENG szuszpenziós injekció sertéseknek	124
ERYSENG PARVO szuszpenziós injekció sertéseknek.....	126
MHYOSPHERE PCV ID emulziós injekció sertéseknek.....	128
RHINISENG szuszpenzió injekcióhoz sertéseknek	130
SUISENG COLI/C vakcina A.U.V. szuszpenziós injekció sertések részére	132
SUISENG DIFF/A vakcina A.U.V. szuszpenziós injekció sertések részére	134
VEPURED szuszpenziós injekció sertéseknek	136

SZARVASMARHA ÉS JUH VAKCINÁK

DIVENCE IBR MARKER LIVE liofilizátum és oldószer emulziós injekcióhoz	140
DIVENCE PENTA liofilizátum és oldószer emulziós injekcióhoz szarvasmarhák részére.....	142
DIVENCE TETRA liofilizátum és oldószer emulziós injekcióhoz szarvasmarhák részére.....	144
HIPRABOVIS SOMNI/Lkt vakcina A.U.V. emulziós injekció szarvasmarhák részére.....	146
INMEVA vakcina A.U.V. szuszpenziós injekció	148
NASYM liofilizátum és oldószer szuszpenziós injekcióhoz vagy orrsprayhez szarvasmarháknak	150

STARTVAC emulziós injekció szarvasmarháknak	152
UBAC emulziós injekció szarvasmarháknak	154

BAROMFI VAKCINÁK (Szájon át adható)

PRIMUN SALMONELLA E vakcina A.U.V. liofilizátum házityúkok számára ivóvízben történő használatra	158
PRIMUN SALMONELLA T vakcina A.U.V. liofilizátum házityúkok számára ivóvízben történő használatra	160

FERTŐTLENÍTŐ ÉS ROVARÖLŐ KÉSZÍTMÉNYEK

AQUAZIX E52 víztisztító-fertőtlenítőszer valamennyi állatfaj részére	164
LITAZIX alomfertőtlenítő- és szárító állatgyógyászati ápolószer valamennyi állatfaj estében.....	166
VIROX fertőtlenítő por	168

PARAZITAELLENES KÉSZÍTMÉNYEK

CRYPTISEL 0,5 mg/ml belsőleges oldat borjak számára A.U.V.....	172
ECOMECTIN 18,7 mg/ml belsőleges paszta lovak részére A.U.V.	174
ELIVEC 5 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarhák részére A.U.V.	176
ESPA COX 50 mg/ml belsőleges szuszpenzió sertések részére A.U.V....	178
FLUBENZIM 50 mg/g gyógypremixon sertések és házityúkok részére A.U.V. .	180

IVERGEN PREMIUM L.A. oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.	182
VETIMEC 6 mg/g gyógypremixon sertések részére.....	184
VETIMEC 10 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	186

EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK (Hormonkészítmények, gyulladáscsökkentők, stb.)

AINIL oldatos injekció A.U.V.	190
ANIMELOXAN 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.	192
AVIACID LIQUID takarmány előkeverék gazdasági haszonállatok részére	194
AZIX FORTE tartósító, savanyító és pH csökkentő takarmány adalékanyag.....	196
BOVIESTIMUL kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére.....	198
CALCIOVET oldatos injekció A.U.V. ..	200
DALMARELIN 25 mikrogram/ml oldatos injekció szarvasmarhák és házinyulak részére	202
DALMAZIN SYNC 0.075 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.	204
DAY ONE ZIX csibezselé	206
DEXAFAST 2 mg/ml oldatos injekció.	208
ENERGYN kiegészítő takarmány gél újszülött malacok részére	210
FINTOX MAXI takarmány adalékanyag előkeverék kérődzők, baromfi és sertés részére.....	212

FINTOX PRO ADVANCE takarmány adalékanyag előkeverék kérődzők, baromfi és sertés részére	214
GLUCOSAL különleges táplálási igényeket kielégítő, diétás kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, gidák és csikók részére	216
HIDRALIP diétás takarmány kiegészítő borjú, malac, bárány, csikó, valamint egyéb fiatal állatoknak.....	218
NEW SCIENCE ZnO mikrokapszulázott cink-oxid tartalmú takarmány előkeverék...220	
NIGLUMINE 50 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha, sertés és ló részére A.U.V.	222
PARTOVET injekció A.U.V.	224
PLUSET por és oldószer oldatos injekcióhoz A.U.V.....	226
SUIFERTIL 4 mg/ml belsőleges oldat sertések részére A.U.V.	228
VETEGLAN 0.75 mg/ml oldatos injekció tehenek, kocák és kancák számára A.U.V.	230
VETERELIN 0.004 mg/ml injekció szarvasmarhák, lovak, sertések és nyulak számára A.U.V.	232

TARTALOMJEGYZÉK

ÁLLATFAJOK SZERINT



GYÓGYPREMIXEK

AIVLOSIN 42,5 mg/g gyógypremix sertések részére	20
BIOTILINA 100 mg/g sertések és házinyulak részére A.U.V.	22
DOXYPREX 100 mg/g gyógypremix sertéseknek A.U.V.	24
RHEMOX PREMIX 100 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V. ...	26
SULFAPREX 250/50 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V.	28
ZOOBIOTIC GLOBULIT 150 mg/l gyógypremix A.U.V.	30

VÍZOLDÉKONY ANTIBIOTIKUMOK

(Belsőleges porok, oldatok)

AIVLOSIN 625 mg/g granulátum ivóvízbe keveréshez sertések részére	36
AMOTRIX 800 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések részére A.U.V.	38
DFV DOXYVET 500 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertés és házityúk számára A.U.V.	40

NIPOXYME 200 mg/g szuszpenzió ivóvízbe keveréshez A.U.V.	44
OCNIL 400 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok részére A.U.V.	46
RHEMOX 500 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések, házityúkok, kacsák és pulykák számára	48
TIATRIX 450 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok részére A.U.V.	50

INJEKCIÓS ANTIBIOTIKUMOK

BOFLOX 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	54
EFICUR 50 mg/ml injekció sertések és szarvasmarhák részére A.U.V.	56
FLORGANE 300 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	58
GENTAMOX injekció A.U.V.	60
QIVITAN 25 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarhák és sertések részére	62
ROXACIN 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	64

SELECTAN 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	66
TULLAVIS 25 mg/ml oldatos injekció sertések számára A.U.V.	68
TULLAVIS 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok számára A.U.V.	70
VETDRAX 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok számára A.U.V.	72

VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK (Szájon át adható)

BETAMINT oldat valamennyi állatfaj részére	76
CHICKTONIC folyékony kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj részére	78
DUNAVIT-C 100% pulvis valamennyi állatfaj részére	80
ESVEX folyékony premix valamennyi állatfaj részére	82
POLIVIT AMINOACIDOS LIQUIDO folyékony kiegészítő takarmány	84
POLIVIT B COMPLEX + AD₃E folyékony takarmány előkeverék	86
PROMOTOR 43 por alakú kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj részére	88
PROMOTOR L 47.0 folyékony kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj részére	90

INJEKCIÓS VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK

DALMAFORT 15mg/ml + 18.22 mg/ml emulziós injekció sertések és szarvasmarhák részére	94
ESVEX injekció A.U.V.	96
METABOLASE injekció szarvasmarha, bivaly, ló, sertés, juh, kecske, nyulak, kutya és macska részére	98
TOCO SELENIO oldatos injekció	100
UNIFERON 200 mg/ml oldatos injekció malacok részére A.U.V.	102

SERTÉS VAKCINÁK

ERYSENG szuszpenziós injekció sertéseknek	124
ERYSENG PARVO szuszpenziós injekció sertéseknek	126
MHYOSPHERE PCV ID emulziós injekció sertéseknek	128
RHINISENG szuszpenzió injekcióhoz sertéseknek	130
SUISENG COLI/C vakcina A.U.V. szuszpenziós injekció sertések részére	132
SUISENG DIFF/A vakcina A.U.V. szuszpenziós injekció sertések részére	134
VEPURED szuszpenziós injekció sertéseknek	136

FERTŐTLENÍTŐ ÉS ROVARŐLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

AQUAZIX E52 víztisztító-fertőtlenítőszer valamennyi állatfaj részére	164
LITAZIX alomfertőtlenítő- és szárító állatgyógyászati ápolószer valamennyi állatfaj estében.....	166
VIROX fertőtlenítő por.....	168

PARAZITAELENES KÉSZÍTMÉNYEK

ESPACOX 50 mg/ml belsőleges szuszpenzió sertések részére A.U.V.	178
FLUBENZIM 50 mg/g gyógypremix sertések és házityúk részére A.U.V. .	180
IVERGEN PREMIUM L.A. oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.	182
VETIMEC 6 mg/g gyógypremix sertések részére.....	184
VETIMEC 10 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	186

EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

(Hormonkészítmények, gyulladáscsökkentők, stb.)

ANIMELOXAN 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.	192
AVIACID LIQUID takarmány előkeverék gazdasági haszonállatok részére	194

AZIX FORTE tartósító, savanyító és pH csökkentő takarmány adalékanyag.....	196
DALMAZIN SYNC 0.075 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.	204
DEXAFAST 2 mg/ml oldatos injekció.	208
ENERGYN kiegészítő takarmány gél újszülött malacok részére	210
FINTOX MAXI takarmány adalékanyag előkeverék kérődzők, baromfi és sertés részére.....	212
FINTOX PRO ADVANCE takarmány adalékanyag előkeverék kérődzők, baromfi és sertés részére	214
GLUCOSAL különleges táplálási igényeket kielégítő, diétás kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, gidák és csikók részére	216
HIDRALIP diétás takarmány kiegészítő borjú, malac, bárány, csikó, valamint egyéb fiatal állatoknak.....	218
NEW SCIENCE ZnO mikrokapszulázott cink-oxid tartalmú takarmány előkeverék... ..	220
NIGLUMINE 50 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha, sertés és ló részére A.U.V.	222
PARTOVET injekció A.U.V.	224
SUIFERTIL 4 mg/ml belsőleges oldat sertések részére A.U.V.	228
VETEGLAN 0.75 mg/ml oldatos injekció tehének, kocák és kancák számára A.U.V.	230
VETERELIN 0.004 mg/ml injekció szarvasmarhák, lovak, sertések és nyulak számára A.U.V.	232





INJEKCIÓS ANTIBIOTIKUMOK

BOFLOX 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	54
EFICUR 50 mg/ml injekció sertések és szarvasmarhák részére A.U.V.	56
FLORGANE 300 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	58
QIVITAN 25 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarhák és sertések részére	62
ROXACIN 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	64
SELECTAN 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	66
TULLAVIS 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok számára A.U.V.	70
VETDRAX 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok számára A.U.V.	72

VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK (Szájon át adható)

BETAMINT oldat valamennyi állatfaj részére.....	76
--	----

CHICKTONIC folyékony kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj részére	78
DUNAVIT-C 100% pulvis valamennyi állatfaj részére.....	80
ESVEX folyékony premix valamennyi állatfaj részére.....	82
POLIVIT AMINOACIDOS LIQUIDO folyékony kiegészítő takarmány	84
POLIVIT B COMPLEX + AD₃E folyékony takarmány előkeverék.....	86
PROMOTOR 43 por alakú kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj részére	88
PROMOTOR L 47.0 folyékony kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj részére	90

INJEKCIÓS VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK

DALMAFORT 15mg/ml + 18.22 mg/ml emulziós injekció sertések és szarvasmarhák részére.....	94
ESVEX injekció A.U.V.	96
METABOLASE injekció szarvasmarha, bivaly, ló, sertés, juh, kecske, nyulak, kutya és macska részére.....	98
TOCO SELENIO oldatos injekció.....	100
VIGOPHOS 100 mg/ml +0,05 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák részére.....	104

SZARVASMARHA TÖGYINFÚZIÓK ÉS MÉHKEZELŐ SZEREK

FATROSEAL intramammális szuszpenzió szárazon álló tehenek számára	108
FATROXIMIN DC 100 mg/5 ml intramammális kenőcs szarvasmarhák és bivalyok részére A.U.V.	110
FATROXIMIN IU 100 mg/13,4 g intrauterin emulzió szarvasmarhák és lovak részére A.U.V.	112
MASTINATON 750 mg/5 g intramammális gél tejelő teheneknek A.U.V.	114
PENETHAONE 236,3 mg/ml por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz, szarvasmarhák számára	116
QIVITAN LC 75 mg intramammális kenőcs tejelő tehenek részére A.U.V. ...	118
UTERTAB 2000 mg méhtabletta szarvasmarhák részére A.U.V.	120

SZARVASMARHA VAKCINÁK

DIVENCE IBR MARKER LIVE liofilizátum és oldószer emulziós injekcióhoz	140
DIVENCE PENTA liofilizátum és oldószer emulziós injekcióhoz szarvasmarhák részére.....	142
DIVENCE TETRA liofilizátum és oldószer emulziós injekcióhoz szarvasmarhák részére.....	144

HIPRABOVIS SOMNI/Lkt vakcina A.U.V. emulziós injekció szarvasmarhák részére.....	146
NASYM liofilizátum és oldószer szuszpenziós injekcióhoz vagy orrsprayhez szarvasmarháknak	150
STARTVAC emulziós injekció szarvasmarháknak	152
UBAC emulziós injekció szarvasmarháknak.....	154

FERTŐTLENÍTŐ ÉS ROVARÖLŐ KÉSZÍTMÉNYEK

AQUAZIX E52 víztisztító-fertőtlenítőszer valamennyi állatfaj részére	164
LITAZIX alomfertőtlenítő- és szárító állatgyógyászati ápolószer valamennyi állatfaj estében.....	166
VIROX fertőtlenítő por	168

PARAZITAELENES KÉSZÍTMÉNYEK

CRYPTISEL 0,5 mg/ml belsőleges oldat borjak számára A.U.V.....	172
ELIVEC 5 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarhák részére A.U.V.	176
IVERGEN PREMIUM L.A. oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.	182
VETIMEC 10 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	186

EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

(Hormonkészítmények,
gyulladáscsökkentők, stb.)

AINIL oldatos injekció A.U.V. 190

ANIMELOXAN 20 mg/ml oldatos
injekció szarvasmarhák, sertések és lovak
számára A.U.V. 192

AVIACID LIQUID takarmány előkeverék
gazdasági haszonállatok részére 194

AZIX FORTE tartósító, savanyító és pH
csökkentő takarmány adalékanyag..... 196

BOVIESTIMUL kiegészítő takarmány
szarvasmarhák részére..... 198

CALCIOVET oldatos injekció A.U.V. .. 200

DALMARELIN 25 mikrogram/ml oldatos
injekció szarvasmarhák és házinyulak
részére 202

DALMAZIN SYNC 0.075 mg/ml oldatos
injekció szarvasmarhák, sertések és lovak
számára A.U.V. 204

DEXAFAST 2 mg/ml oldatos injekció. 208

FINTOX MAXI takarmány adalékanyag
előkeverék kérődzők, baromfi és sertés
részére..... 212

FINTOX PRO ADVANCE takarmány
adalékanyag előkeverék kérődzők,
baromfi és sertés részére 214

GLUCOSAL különleges táplálási
igényeket kielégítő, diétás kiegészítő
takarmány borjak, malacok, bárányok,
gidák és csikók részére 216

HIDRALIP diétás takarmány kiegészítő
borjú, malac, bárány, csikó, valamint
egyéb fiatal állatoknak..... 218

NIGLUMINE 50 mg/ml oldatos injekció
szarvasmarha, sertés és ló részére A.U.V. 222

PARTOVET injekció A.U.V. 224

PLUSET por és oldószer oldatos
injekcióhoz A.U.V..... 226

VETEGLAN 0.75 mg/ml oldatos injekció
tehenek, kocák és kancák számára
A.U.V. 230

VETERELIN 0.004 mg/ml injekció
szarvasmarhák, lovak, sertések és
nyulak számára A.U.V. 232



INJEKCIÓS ANTIBIOTIKUMOK

TULLAVIS 100 mg/ml oldatos injekció
szarvasmarhák, sertések és juhok
számára A.U.V. 70

VETDRAX 100 mg/ml oldatos injekció
szarvasmarhák, sertések és juhok
számára A.U.V. 72

VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK (Szájon át adható)

BETAMINT oldat valamennyi állatfaj
részére..... 76

CHICKTONIC folyékony kiegészítő
takarmány valamennyi állatfaj
részére 78

DUNAVIT-C 100% pulvis valamennyi
állatfaj részére..... 80

ESVEX folyékony premix valamennyi
állatfaj részére..... 82

POLIVIT AMINOACIDOS LIQUIDO
folyékony kiegészítő takarmány 84

POLIVIT B COMPLEX + AD3E
folyékony takarmány előkeverék..... 86

PROMOTOR 43 por alakú kiegészítő
takarmány valamennyi állatfaj
részére 88

PROMOTOR L 47.0 folyékony
kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj
részére 90

INJEKCIÓS VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK

ESVEX injekció A.U.V. 96

METABOLASE injekció szarvasmarha,
bivaly, ló, sertés, juh, kecske, nyulak,
kutya és macska részére 98

TOCO SELENIO oldatos injekció 100

JUH VAKCINÁK

INMEVA vakcina A.U.V. szuszpenziós
injekció 148

FERTŐTLENÍTŐ ÉS ROVARÖLŐ KÉSZÍTMÉNYEK

AQUAZIX E52 víztisztító-fertőtlenítőszer
valamennyi állatfaj részére 164

LITAZIX alomfertőtlenítő- és szárító
állatgyógyászati ápolószer valamennyi
állatfaj estében..... 166

VIROX fertőtlenítő por 168

PARAZITAELENES KÉSZÍTMÉNYEK

IVERGEN PREMIUM L.A. oldatos
injekció szarvasmarhák, sertések és juhok
részére A.U.V. 182

VETIMEC 10 mg/ml oldatos
injekció A.U.V. 186

EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

(Hormonkészítmények,
gyulladáscsökkentők, stb.)

AVIACID LIQUID takarmány előkeverék
gazdasági haszonállatok részére194

AZIX FORTE tartósító, savanyító és pH
csökkentő takarmány adalékanyag.....196

CALCIOVET oldatos injekció A.U.V. .. 200


FINTOX MAXI takarmány adalékanyag
előkeverék kérődzők, baromfi és sertés
részére.....212

FINTOX PRO ADVANCE takarmány
adalékanyag előkeverék kérődzők,
baromfi és sertés részére214

GLUCOSAL különleges táplálási
igényeket kielégítő, diétás kiegészítő
takarmány borjak, malacok, bárányok,
gidák és csikók részére216

HIDRALIP diétás takarmány kiegészítő
borjú, malac, bárány, csikó, valamint
egyéb fiatal állatoknak.....218

PARTOVET injekció A.U.V. 224



VÍZOLDÉKONY ANTIBIOTIKUMOK

(Belsőleges porok, oldatok)

AIVLOSIN 625 mg/g granulátum ivóvízbe
keveréshez házityúkok és pulykák részére
34

DFV DOXYVET 500 mg/g por ivóvízbe
keveréshez sertés és házityúk számára
A.U.V. 40

GANADEXIL ENROFLOXACINA
100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez
házityúkoknak A.U.V..... 42

OCNIL 400 mg/g por ivóvízbe
keveréshez sertések és házityúkok
részére A.U.V. 46

RHEMOX 500 mg/g por ivóvízbe
keveréshez sertések, házityúkok, kacsák
és pulykák számára 48

TIATRIX 450 mg/g por ivóvízbe
keveréshez sertések és házityúkok
részére A.U.V. 50

BAROMFI VAKCINÁK

(Szájon át adható)

PRIMUN SALMONELLA E vakcina
A.U.V. liofilizátum házityúkok számára
ivóvízben történő használatra158

PRIMUN SALMONELLA T vakcina
A.U.V. liofilizátum házityúkok számára
ivóvízben történő használatra160

FERTŐTLENÍTŐ ÉS ROVARŐLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

AQUAZIX E52 víztisztító-fertőtlenítőszer
valamennyi állatfaj részére164

LITAZIX alomfertőtlenítő- és szárító
állatgyógyászati ápolószer valamennyi
állatfaj estében.....166

VIROX fertőtlenítő por168

PARAZITAELENES KÉSZÍTMÉNYEK

FLUBENZIM 50 mg/g gyógypremix
sertések és házityúkok részére A.U.V. .180

EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

(Hormonkészítmények,
gyulladáscsökkentők, stb.)

AVIACID LIQUID takarmány előkeverék
gazdasági haszonállatok részére194

AZIX FORTE tartósító, savanyító és pH
csökkentő takarmány adalékanyag.....196

DAY ONE ZIX csibezsélé 206

FINTOX MAXI takarmány adalékanyag
előkeverék kérődzők, baromfi és sertés
részére.....212

FINTOX PRO ADVANCE takarmány
adalékanyag előkeverék kérődzők,
baromfi és sertés részére214



INJEKCIÓS VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK

METABOLASE injekció szarvasmarha, bivaly, ló, sertés, juh, kecske, nyulak, kutya és macska részére 98

FERTŐTLENÍTŐ KÉSZÍTMÉNYEK

LITAZIX alomfertőtlenítő- és szárító állatgyógyászati ápolószer valamennyi állatfaj estében..... 168

PARAZITAELENES KÉSZÍTMÉNYEK

ECOMECTIN 18,7 mg/ml belsőleges paszta lovak részére A.U.V. 174

EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

(Hormonkészítmények,
gyulladáscsökkentők, stb.)

AINIL oldatos injekció A.U.V.190

ANIMELOXAN 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.192

AZIX FORTE tartósító, savanyító és pH csökkentő takarmány adalékanyag.....196

DALMAZIN SYNC 0.075 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V. 204

DEXAFAST 2 mg/ml oldatos injekció. 208

GLUCOSAL különleges táplálási igényeket kielégítő, diétás kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, gidák és csikók részére216

HIDRALIP diétás takarmány kiegészítő borjú, malac, bárány, csikó, valamint egyéb fiatal állatoknak.....218

NIGLUMINE 50 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha, sertés és ló részére A.U.V. 222

PARTOVET injekció A.U.V. 224

VETEGLAN 0.75 mg/ml oldatos injekció tehenek, kocák és kancák számára A.U.V. 230

VETERELIN 0.004 mg/ml injekció szarvasmarhák, lovak, sertések és nyulak számára A.U.V. 232





GYÓGYPREMIXEK



► HATÓANYAG

Tilvalozin 42,5 mg/g

► JAVALLAT

Sertésekben a *Mycoplasma hyopneumoniae* törzsek okozta enzoociás pneumónia kezelésére és megelőzésére. A *Lawsonia intracellularis* okozta sertések proliferatív enteropátiája (ileitis, PPE) kezelésére olyan állományokban, ahol a betegséget a kórelőzmény, a klinikai tünetek és a kórbonctani vizsgálatok alapján diagnosztizálták.

A *Brachyspira hyodysenteriae* okozta sertésdizentéria kezelésére olyan állományokban, ahol a betegséget diagnosztizálták, valamint a további megbetegedések megelőzésére.

► ADAGOLÁS

Takarmányba keverve alkalmazandó. Kizárólag száraz takarmányba keverhető. Sertések *Mycoplasma*-pneumóniájának kezelésére és megelőzésére. Naponta 2,125 mg/ttkg tilvalozin-tartarát, 7 egymást követő napon át. Sertések proliferatív enteropátiája (ileitis) kezelésére. Naponta 4,25 mg/ttkg tilvalozin-tartarát, 10 egymást követő napon át.

Sertésdizentéria kezelésére és megelőzésére.

Naponta 4,25 mg/ttkg tilvalozin-tartarát, 10 egymást követő napon át.

Idősebb vagy csökkent étvágyú, valamint korlátozott takarmány-felvételű sertések esetében a gyógypremix bekeverési aránya (1-2 kg/tonna takarmány) növelhető az előírt hatóanyag mennyiség elérése céljából.

Amennyiben a takarmány-felvétel csökken, az alábbi képletet alkalmazzuk:

Kg premix/takarmánytonna=

$\frac{\text{Adag (mg/ttkg)} \times \text{testtömeg (kg)}}{\text{Napi takarmány-felvétel (kg)} \times \text{Premix koncentrációja (mg/g)}}$

A gyógyszerrel kevert takarmány pelletálható. Az alkotóelemek előkészítését 5 perces gőzöléssel kell elvégezni, majd ezt követően legfeljebb 70 °C-on, normál feltételek között pelletálható.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: 2 nap.

► KISZERELÉS

20 kg

- ✓ GAZDASÁGOS
- ✓ HATÉKONY
- ✓ GYORS
- ✓ MEGBÍZHATÓ

AIVLOSIN®



Ileitis, mycoplasma-phneunonia és sertésdizentéria kezelésére és megelőzésére



Biotilina

100 mg/g sertések és házinyulak részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Valnemulin 100 mg/g, (megfelel 106,5 mg valnemulin-hidrokloridnak)

► JAVALLAT

Sertés:

- Valnemulinra érzékeny *Brachyspira hyodysenteria* okozta sertésdizentéria és *Mycoplasma hyopneumoniae* okozta sertés enzoociás pneumóniájának kezelésére és metafilaxisára, valamint *Lawsonia intracellularis* okozta sertések proliferatív enteropátiája (ileitisz) klinikai tüneteinek kezelésére.

Házinyúl: Az elhullás csökkentésére epizootiás nyúl enteropátia (ERE) kitörés esetében.

► ADAGOLÁS

Takarmányba keverve alkalmazandó.

Sertések *Mycoplasma*-pneumóniájának kezelésére és megelőzésére:

10-12 mg valnemulin/ttkg/nap, 3 hétig, ez 2-2,4 kg gyógypremix/tonna takarmánynak felel meg.

Sertések proliferatív enteropátiája (ileitisz) kezelésére:

3-4 mg valnemulin/ttkg/nap, 2 hétig, ez

0,6-0,8 kg gyógypremix/tonna takarmánynak felel meg.

Sertésdizentéria kezelésére és megelőzésére:

3-4 mg valnemulin/ttkg/nap, 7-10 napig. Ez az adag 0,6-0,8 kg gyógypremix/tonna takarmánynak felel meg.

Házinyúl: epizootiás nyúl enteropátia esetén az elhullás csökkentésére:

3 mg/ttkg/nap, 21napig, ez az adag 0,35 kg gyógypremix/tonna takarmánynak felel meg.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés hús és egyéb ehető szövetek:

1 nap.

Házinyúl hús és egyéb ehető szövetek:

0 nap.


► KISZERELÉS

25 kg

Biotilina

100 mg/g gyógypremix

25 kg



Doxyprex

100 mg/g gyógypremixon sertéseknek A.U.V.

► HATÓANYAG

Doxiciklin (doxiciklin-hiklát formában) 100 mg/g védett (BMP: Bi-Modal Protection) premix granulátum formájában

► JAVALLAT

Sertések részére.

Doxiciklinre érzékeny *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica* és *Mycoplasma hyopneumoniae* törzsek okozta fertőző légzőszervi megbetegedések gyógykezelésére.

► ADAGOLÁS

Szájon át, takarmányba keverve alkalmazandó.

A készítmény általános adagja 10 mg doxiciklin/ttkg/nap 7 napon keresztül takarmányhoz keverve, ami megfelel 2,5 kg/tonna takarmány adagnak.

A takarmányfelvétel függ az állatok klinikai állapotától, ezért a bekeverési arányt az aktuális takarmányfogyasztás alapján kell kiszámolni.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés hús és egyéb ehető szövetek: 7 nap.

► KISZERELÉS

25 kg



DOXYPREX

A VÉDETT PREMIX BMP molekuláris védelem



Rhemox premix

100 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Amoxicillin-trihidrát 100 mg/g védett (BMP: Bi-Modal Protection) premix granulátum formájában

► JAVALLAT

Amoxicillinre érzékeny *Streptococcus suis* törzsek által okozott fertőzések megelőzésére és gyógykezelésére választás utáni **sertésekben**.

► ADAGOLÁS

Szájon át, takarmányba keverve alkalmazandó.

Általános adag:

15 mg amoxicillin/ttkg/nap, 15 napig.
Ez megfelel 0,15 g Rhemox premix/ttkg/nap adagnak.

Ez az adagolás megfelel 3,0 kg/tonna keverési aránynak (örleményben, vagy granulátumban).

A megfelelő adagolás érdekében az antibiotikum koncentrációjának beállításakor figyelembe kell venni a kezelés megkezdésekor mért napi takarmányfogyasztást!

Az aluldozírozás elkerülése és a pontos adagolás biztosítása érdekében a testtömeget a lehető legpontosabban kell meghatározni.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap.

► KISZERELÉS

24 kg

Rhemox Premix

Amoxicillin 10% premix

Az egyetlen AMOXICILLIN premix BMP védelemmel



Sulfaprex

250/50 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Szulfadiazin 250 mg/g
Trimetoprim 50 mg/g

► JAVALLAT

Sertések részére.

Masztitisz-metritisz-agalakcia (MMA) szindróma, torzító orrgyulladás (amennyiben *Bordetella bronchiseptica-val* áll összefüggésben), és a szulfadiazin-trimetoprim kombinációra érzékeny *E.coli*-törzsek okozta hasmenés gyógykezelésére.

► ADAGOLÁS

Takarmányba keverve alkalmazandó.

30 mg kombinált hatóanyag (25 mg szulfadiazin és 5 mg trimetoprim)/ttkg/nap, 5 egymást követő napon át, amely megfelel 1 g készítmény/10 ttkg/nap, vagy 2-4 kg/tonna takarmány dózishoz, 5 egymást követő napon át.

A kezelni kívánt állatok testtömegét a lehető legpontosabban meg kell határozni az aluladagolás elkerülése érdekében. Mivel a gyógyszeres takarmány felvétele az állat klinikai állapotától függ, ezért

a helyes adagolás biztosítása érdekében a bekeverési arányt az aktuális takarmányfogyasztást figyelembe véve kell beállítani.

A gyógyszerezett takarmány felvétele függ az állat klinikai állapotától. A megfelelő adagolás biztosítása érdekében az antimikrobiális szer koncentrációját ennek megfelelően kell beállítani. 75°C felett nem pelletálható.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap.

► KISZERELÉS

25 kg

SULFAPREX

Gyógypremix sertések részére A.U.V.

SZINERGISTA KOMBINÁCIÓ – BAKTERICID HATÁS

- MMA szindróma
- Torzító orrgyulladás
- *E. coli* hasmenés ellen



**Korszerű összetétel
Nincs felporzás**



ZOOBIOTIC GLOBULIT

150 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Amoxicillin-trihidrát 150 mg/g védett (GLOBULIT) premix granulátum formájában.

► JAVALLAT

Választott malacok amoxicillinre érzékeny *Streptococcus suis* törzsek által okozott fertőzések megelőzésére és gyógykezelésére.

► ADAGOLÁS

Szájon át, takarmányba keverve alkalmazandó.

Általános adag:

15 mg amoxicillin/ttkg/nap, 15 napig.

Ez az adagolás megfelel 2,0 kg/tonna keverési aránynak (örleményben, vagy granulátumban).

A megfelelő adagolás érdekében az antibiotikum koncentrációjának beállításakor figyelembe kell venni a kezelés megkezdésekor mért napi takarmányfogyasztás! Az aluldozózás elkerülése és a pontos adagolás biztosítása érdekében a testtömeget a lehető legpontosabban kell meghatározni.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek:
7 nap.


► KISZERELÉS

25 kg



ZOOBIOTIC GLOBULIT

Gyógypremix





VÍZOLDÉKONY ANTIBIOTIKUMOK



Aivlosin

625 mg/g granulátum ivóvízbe keveréshez házityúkok és pulykák részére

► HATÓANYAG

Tilvalozin (tilvalozin-tartarát formájában) 625 mg/g

► JAVALLAT

Sertések *Lawsonia intracellularis* okozta proliferatív enteropátiájának (ileitis) kezelésére és metafilaxisára.

Sertésekben a tilvalozinra érzékeny *Mycoplasma hyopneumoniae* törzsek okozta enzoociás pneumónia kezelésére és metafilaxisára.

► ADAGOLÁS

Ivóvízbe keverve.

A helyes adagolás biztosításához a testtömeget a lehető legpontosabban kell meghatározni. A készítményt annyi vízhez kell adni, amennyit a sertések egy nap alatt elfogyasztanak. A kezelés alatt más ivóvízforrás nem állhat rendelkezésre.

Sertések *Lawsonia intracellularis* okozta proliferatív enteropátiája (ileitis):

Az adag naponta 5 mg/ttkg tilvalozin ivóvízbe keverve 5 egymást követő napon át.

A termék szükséges összmennyisége az alábbi képlet segítségével számítható ki:

A termék grammban megadott össz tömege = a kezelni kívánt legnagyobb testtömegű sertés testtömege (kg) x sertések száma x 5/625.

A 160 g-os tasak 20.000 kg össz tömegű sertés egy napi kezelésére elegendő. A 400 g-os

tasak 50.000 kg össz tömegű sertés egy napi kezelésére elegendő.

Sertések tilvalozinra érzékeny *Mycoplasma hyopneumoniae* törzsek okozta enzoociás pneumóniája:

Az adag naponta 10 mg/ttkg tilvalozin ivóvízbe keverve 5 egymást követő napon át.

A termék szükséges összmennyisége az alábbi képlet segítségével számítható ki:

A termék grammban megadott össz tömege = a kezelni kívánt legnagyobb testtömegű sertés testtömege (kg) x sertések száma x 10/625.

A 160 g-os tasak 10.000 kg össz tömegű sertés egy napi kezelésére elegendő. A 400 g-os tasak 25.000 kg össz tömegű sertés egy napi kezelésére elegendő.

Ha a terméket közvetlenül az ivóvízrendszerbe keveri, akkor a tasak tartalmát szórja a víz felszínére, majd alaposan keverje össze, amíg átlátszó oldat nem keletkezik (általában 3 percen belül).

Amennyiben törzsoldatot készít, akkor a maximális koncentráció 15.000 ml vízben 400 g készítmény legyen, és az oldatot 10 percen keresztül keverni kell. A gyógyszeres ivóvizet 24 óránként cserélni kell.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: 2 nap.

► KISZERELÉS

160 g, 400 g



AIVLOSIN 625mg/g

AIVLOSIN, A MYCOPLASMA ELLENES KEZELÉS TOJÓKNAK

Mycoplasma elleni kiemelkedő eredményeivel az Aivlosin időt és pénzt takarít meg Önnek

- ✓ Állományra szabott kezelés
- ✓ Kiemelkedő eredmények
- ✓ Bizonyított hatékonyság
- ✓ Ízletes
- ✓ Alacsony terápiás dózis
- ✓ Megvédi a tojás minőségét
- ✓ Nulla nap várakozási idő tojásra



ECO



AIVLOSIN®

Aivlosin

625 mg/g granulátum ivóvízbe keveréshez sertések részére

► HATÓANYAG

Tilvalozin (tilvalozin-tartarát formájában) 625 mg/g

► JAVALLAT

Sertések *Lawsonia intracellularis* okozta proliferatív enteropátiájának (ileitis) kezelésére és metafilaxisára.

Sertésekben a tilvalozinra érzékeny *Mycoplasma hyopneumoniae* törzsek okozta enzoociás pneumónia kezelésére és metafilaxisára.

► ADAGOLÁS

Ivóvízbe keverve.

A helyes adagolás biztosításához a testtömeget a lehető legpontosabban kell meghatározni. A készítményt annyi vízhez kell adni, amennyit a sertések egy nap alatt elfogyasztanak. A kezelés alatt más ivóvízforrás nem állhat rendelkezésre.

Sertések *Lawsonia intracellularis* okozta proliferatív enteropátiája (ileitis):

Az adag naponta 5 mg/ttkg tilvalozin ivóvízbe keverve 5 egymást követő napon át.

A termék szükséges összmennyisége az alábbi képlet segítségével számítható ki:

A termék grammban megadott összértéke = a kezelni kívánt legnagyobb testtömegű sertés testtömege (kg) x sertések száma x 5/625.

A 160 g-os tasak 20.000 kg összértéke egy napi kezelésére elegendő. A 400 g-os

tasak 50.000 kg összértéke egy napi kezelésére elegendő.

Sertések tilvalozinra érzékeny *Mycoplasma hyopneumoniae* törzsek okozta enzoociás pneumóniája:

Az adag naponta 10 mg/ttkg tilvalozin ivóvízbe keverve 5 egymást követő napon át.

A termék szükséges összmennyisége az alábbi képlet segítségével számítható ki:

A termék grammban megadott összértéke = a kezelni kívánt legnagyobb testtömegű sertés testtömege (kg) x sertések száma x 10/625.

A 160 g-os tasak 10.000 kg összértéke egy napi kezelésére elegendő. A 400 g-os tasak 25.000 kg összértéke egy napi kezelésére elegendő.

Ha a terméket közvetlenül az ivóvízrendszerbe keveri, akkor a tasak tartalmát szórja a víz felszínére, majd alaposan keverje össze, amíg átlátszó oldat nem keletkezik (általában 3 percen belül).

Amennyiben törzsolatot készít, akkor a maximális koncentráció 15.000 ml vízben 400 g készítmény legyen, és az oldatot 10 percen keresztül keverni kell. A gyógyszeres ivóvizet 24 óránként cserélni kell.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: 2 nap.

► KISZERELÉS

160 g, 400 g



USON

LÉPÉSELŐNYBEN

Az ileitis és a mycoplasma kontroll legmodernebb eszköze



Amotrix

800 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések részére
A.U.V.

► **HATÓANYAG**

Amoxicillin-trihidrát 800 mg/g

► **JAVALLAT**

Sertések részére.
Amoxicillinre érzékeny *Actinobacillus pleuropneumoniae* által okozott pleuropneumónia, valamint *Streptococcus suis* okozta fertőzések gyógykezelésére.

► **ADAGOLÁS**

Szájon át, az állatok ivóvizébe keverve alkalmazandó.

Általános adag:

20 mg amoxicillin-trihidrát/ttkg/nap öt napon át, amely megfelel 28,7 mg AMOTRIX 800 mg/g készítmény/ttkg/nap adagolásnak.

A következő számítás alkalmazható az ivóvízben feloldandó AMOTRIX 800 mg/g por mennyiségének meghatározásához:

$$\frac{28,7 \text{ mg készítmény/ttkg/nap}}{\text{előző napi teljes vízfogyasztás (l)}} \times \frac{\text{Kezelendő állatok átlagos testtömege (kg)}}{\text{állatok száma}} = \text{mg készítmény/liter ivóvíz}$$

► **VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Hús és egyéb ehető szövetek: 9 nap.

► **KISZERELÉS**

1 kg

Amotrix 800 por belsőleges oldathoz A.U.V.



Amoxicillin a koncentráció erejével



DVF Doxyvet

500 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertés és házityúk számára A.U.V.

► HATÓANYAG

Doxiciklin-hiklát 500,0 mg/g, ami megfelel 433 mg/g doxiciklin bázisnak.

► JAVALLAT

Sertések: doxiciklinre érzékeny *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* és *Pasteurella multocida* törzsek által okozott légzőszervi megbetegedések gyógykezelésére.

Házityúk: doxiciklinre érzékeny *Pasteurella multocida* és *Ornithobacter rhinotrachealae* (ORT) okozta légzőszervi megbetegedések gyógykezelésére.

► ADAGOLÁS

Ivóvízben történő alkalmazásra.

Sertések 12,5 mg doxiciklin-hiklát/ttkg/nap (megfelel 25,0 mg/ttkg készítménynek) az ivóvízbe keverve, 4 egymást követő napon keresztül.

Házityúk kezelésére 10 mg doxiciklin-hiklát/ttkg/nap (megfelel 20,0 mg/ttkg készítménynek) az ivóvízbe keverve, 3-4 egymást követő napon keresztül *Pasteurella multocida* okozta fertőzés esetén.

Házityúk kezelésére 20 mg doxiciklin-hiklát/ttkg/nap (megfelel 40,0 mg/ttkg készítménynek) az ivóvízbe keverve, 3-4 egymást követő napon keresztül *Ornithobacter rhinotrachealae* okozta fertőzés esetén.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertések:

hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap

Házityúk:

A 4 napon át adott 10 mg/ttkg dózist követően: hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap.

A 4 napon át adott 20 mg/ttkg dózist követően: hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojást termelő madarak kezelésére nem engedélyezett.

Nem alkalmazható a tojásrakás kezdete előtt 4 héttel.

► KISZERELÉS

1 kg



DVF Doxivet

500 mg/g por ivóvízbe keveréshez



DFV®

Kiváló minőség és stabilitás

Ganadexil Enrofloxacina

**100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez házityúkoknak
A.U.V.**

► HATÓANYAG

Enrofloxacin 100 mg/ml

► JAVALLAT

Az enrofloxacinra érzékeny alábbi baktériumok által okozott fertőzések kezelésére:

Házityúk

Mycoplasma gallisepticum, *Mycoplasma synoviae*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pasteurella multocida*.

► ADAGOLÁS

Ivóvízbe keverve alkalmazandó.
Naponta friss oldatot kell készíteni.

Naponta 10 mg enrofloxacin/ttkg,
3-5 egymást követő napon keresztül.

A napi adag megfelel 0,1 ml készítmény/
ttkg, illetve 500 ml készítmény/1000 liter
ivóvíz, naponta egyszer.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Házityúk:

hús és egyéb ehető szövetek: 7 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojáshoz termelő madarak kezelésére nem engedélyezett.
Nem alkalmazható leendő tojóállományoknál a tojáshozás várható kezdete előtti 14 napon belül.


► KISZERELÉS

1 liter

**Ganadexil®
Enrofloxacina**

1 liter

**Az utánoszhatatlan
klasszikus...**



Nipoxyme

200 mg/g szuszpenzió ivóvízbe keveréshez A.U.V.

► HATÓANYAG

Kolisztin szulfát 6 millió NE/g, amely megfelel 200 mg/g-nak

► JAVALLAT

Sertés (választott malac, hízósertés) számára.

Kolisztinre érzékeny, nem invazív *E. coli* okozta emésztőrendszeri fertőzések gyógykezelésére és metafilaxisára.

A metafilaktikus kezelés előtt igazolni kell a betegség jelenlétét az állományban.

► ADAGOLÁS

Szájon át, ivóvízbe keverve alkalmazandó.

A javasolt adag 100.000 NE/ttkg/nap, 3-5 napig, ami megfelel 0,016 ml szuszpenzió/ttkg/nap-nak, 3-5 napon át. Alkalmazás előtt alaposan fel kell rázni!

A pontos adagolás eléréséhez és az aluadagolás elkerülésének érdekében a kezelendő állatok testtömegét a lehető legpontosabban kell meghatározni.

A kezelés időtartamának a betegség kezeléséhez szükséges minimális időre kell korlátozódnia.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap.

► KISZERELÉS

1 kg



A MAXIMÁLISAN KONCENTRÁLT ERŐ

Hatékonyság mindenekelőtt



NIPOXYME®

Kiváló vízőldékonyság

Maximális stabilitás

Egy napos várakozási idő



Ocnil

400 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések és házityúk részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Linkomicin 400 mg (ami megfelel 450 mg linkomicin-hidrokloridnak)

► JAVALLAT

Sertés:

A *Mycoplasma hyopneumoniae* által okozott enzoóciás pneumónia kezelésére és metafilaxisára. A betegség jelenlétét az állományban a készítmény használata előtt igazolni kell.

Házityúk:

A linkomicinre érzékeny *Clostridium perfringens* által okozott elhalásos bélgyulladás kezelésére és metafilaxisára. A betegség jelenlétét az állományban a készítmény használata előtt igazolni kell.

► ADAGOLÁS

Ivóvízbe keverve alkalmazandó.

Sertés:

Enzoóciás pneumónia: 10 mg linkomicin/ttkg (megfelel 25 mg készítménynek ttkg-onként) 21 egymást követő napon át.

Házityúk:

Elhalásos bélgyulladás: 5 mg linkomicin/ttkg (megfelel 12,5 mg készítménynek

ttkg-onként) 7 egymást követő napon át.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés:

Hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap.

Házityúk:

Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojást termelő madarak kezelésére nem engedélyezett.

► KISZERELÉS

1 kg

OCNIL 400 mg/g 1 kg

Kitűnő oldódás

Maximális stabilitás

Rövid várakozási idő



Rhemox

**500 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések, házityúk-
kok, kacsák és pulykák számára**

► HATÓANYAG

Amoxicillin-trihidrát 500 mg/g

► JAVALLAT

Sertés: amoxicillinre érzékeny *Streptococcus suis* törzsek által okozott fertőzések kezelésére.

Brojler csirke, brojler kacsája és húspulyka: amoxicillinre érzékeny *Pasteurella spp.* és *Escherichia coli* törzsek által okozott pasteurellosis és colibacillosis kezelésére.

► ADAGOLÁS

Ivóvízbe keverve alkalmazandó.

Sertés: 24 óránként 20 mg amoxicillin-trihidrát - ami megfelel 17,4 mg amoxicillinnek - ttkg-onként (ami megfelel napi 40 mg készítménynek ttkg-onként) 4 napig.

Brojler csirke: 24 óránként 15 mg amoxicillin-trihidrát - ami megfelel 13,1 mg amoxicillinnek - ttkg-onként (ami megfelel napi 30 mg készítménynek ttkg-onként) 5 napig.

Brojler kacsája: 24 óránként 20 mg amoxicillin-trihidrát - ami megfelel 17,4 mg amoxicillinnek - ttkg-onként (ami megfelel napi 40 mg készítménynek ttkg-onként) 3 napig.

Húspulyka: 24 óránként 15-20 mg amoxicillin-trihidrát - ami megfelel 13,1-17,4 mg amoxicillinnek ttkg-onként (ami megfelel napi 30-40 mg készítménynek ttkg-onként) 5 napig.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek:

Sertés:	6 nap
Házityúk:	1 nap
Pulyka:	5 nap
Kacsa:	9 nap

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojástartó madarak kezelésére nem engedélyezett.

Nem alkalmazható a tojástartás kezdete előtti 4 hétben.

► KISZERELÉS

1 kg

Rhemox 500

Rhemox 500 mg/g por ivóvízbe keveréshez
sertések, házityúk, kacsák és pulykák számára

**Garantált oldékonyság
és stabilitás**



Minőség az utolsó cseppig



Tiatrix

450 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések és házityúk részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Tiamulin-hidrogén-fumarát 450 mg/g

► JAVALLAT

Sertések *Brachyspira hyodysenteriae* okozta sertésdizentériájának, valamint **házityúk** *Mycoplasma synoviae* és *Mycoplasma gallisepticum* okozta légzőszervi megbetegedéseinek gyógykezelésére.

► ADAGOLÁS

Szájon át, ivóvízbe keverve alkalmazandó.

Általános adagja:

Sertés: 10 mg tiamulin-hidrogén-fumarát/ttkg/nap, azaz 22,2 mg Tiatrix 450 mg/g készítmény/ttkg/nap. A kezelés időtartama 5 nap.

Házityúk (brojlercsirke): 25 mg tiamulin-hidrogén-fumarát/ttkg/nap, azaz 55,6 mg Tiatrix 450 mg/g készítmény/ttkg/nap. A kezelés időtartama 5 nap.

A helyes adagolás érdekében a testtömeget a lehető legpontosabban kell meghatározni, hogy az aluldozírozás elkerülhető legyen.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés:

Hús és egyéb ehető szövetek: 10 nap.

Házityúk:

Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap.


A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojást termelő madarak kezelésére nem engedélyezett.

► KISZERELÉS

1 kg, 5 kg, 10 kg

Tiatrix 450

- ✓ Kiváló minőségű generikus termék
- ✓ Rugalmas alkalmazhatóság
- ✓ 3 féle kiszerelés



DUNAVET



INJEKCIÓS ANTIBIOTIKUMOK



100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.

► HATÓANYAG

1 ml tartalmaz: marbofloxacin 100 mg

JAVALLAT

Szarvasmarha

Marbofloxacinra érzékeny *Histophilus somni*, *Mannheimia haemolytica*, *Mycoplasma bovis* vagy *Pasteurella multocida* törzsek által okozott légzőszervi fertőzések gyógykezelésére; marbofloxacinra érzékeny *Escherichia coli* törzsek okozta heveny tőgygyulladás gyógykezelésére laktációs időszakban.

Sertés

Marbofloxacin iránt érzékeny baktériumtörzsek által okozott posztpartum diszgalakcia szindróma -PDS- (metritisz-masztitisz-agalakcia szindróma) gyógykezelésére.

► ADAGOLÁS

Szarvasmarha: intramuszkuláris, szubkután vagy intravénás alkalmazás.

Légzőszervi fertőzések:

Javasolt dózis: 8 mg marbofloxacin/ttkg (2 ml állatgyógyászati készítmény/25 ttkg) egyetlen intramuszkuláris injekcióban.

20 ml-nél nagyobb térfogat beadása esetén az adagot legalább két beadási helyre szét kell osztani.

Mycoplasma bovis által okozott légzőszervi fertőzések esetén a javasolt dózis 2 mg marbofloxacin/ttkg (1 ml állatgyógyászati készítmény/50 ttkg) napi egy intramuszkuláris vagy szubkután injekcióban 3-5 egymást

követő napon át. Az első injekció intravénásan is beadható.

Heveny tőgygyulladás:

Intramuszkuláris vagy szubkután beadás:

Javasolt dózis: 2 mg marbofloxacin/ttkg (1 ml állatgyógyászati készítmény/50 ttkg) napi egy injekcióban 3 egymást követő napon át. Az első injekció intravénásan is beadható.

Sertés (koca): intramuszkuláris alkalmazás
Javasolt dózis: 2 mg marbofloxacin/ttkg (1 ml állatgyógyászati készítmény/50 ttkg) napi egy injekcióban 3 egymást követő napon át.

Az injekciót szarvasmarháknál és sertéseknél is a nyaki területre javasolt beadni.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha:

2 mg/ttkg IV, IM és SC adagolás esetén hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap, tej: 36 óra.
8 mg/ttkg IM egyszeri adagolás esetén hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap, tej: 72 óra.

Sertés (koca):

Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap.

► KISZERELÉS

100 ml



Boflox

100 mg/ml



Hatékony



Alkalmazása könnyű



Gyors



Rövid ÉEVI



Biztonságos



Ritka rezisztencia

Második generációs fluorokinolon
Az állatgyógyászat számára kifejlesztve



50 mg/ml injekció sertések és szarvasmarhák részére A.U.V.

► HATÓANYAG

1 ml tartalmaz: ceftiofur 50 mg

► JAVALLAT

Ceftiofurra érzékeny baktériumok okozta fertőzések kezelésére:

Sertés:

A *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* és *Streptococcus suis* törzsek által okozott légzőszervi megbetegedések kezelésére.

Szarvasmarha:

A *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* és *Histophilus somni* törzsek által okozott légzőszervi megbetegedések kezelésére.

A *Fusobacterium necrophorum* és *Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*) törzsek okozta heveny interdigitális nekrobacillózis (panaritium, bűdös sántaság) kezelésére.

Az ellés után 10 napon belül kialakuló heveny posztpartum (puerperiális) metritisz kezelésére, amelynek kialakulása összefügg a ceftiofurra érzékeny *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* vagy *Fusobacterium necrophorum* fertőzéssel (kizárólag azoknál az eseteknél, ahol a más antimikrobiális készítményekkel való kezelés nem hozott eredményt).

► ADAGOLÁS

Sertés: 3 mg ceftiofur/ttkg/nap intramuszkulá

ris injekció formájában, naponta egyszer 3 napon át, azaz 1 ml készítmény/16 ttkg naponta.

Szarvasmarha: Légzőszervi megbetegedés kezelése: 1 mg ceftiofur/ttkg/nap szubkután injekció formájában, naponta egyszer 3-5 napon át, azaz 1 ml készítmény/50 ttkg naponta.

Heveny interdigitális nekrobacillózis kezelése: 1 mg ceftiofur/ttkg/nap szubkután injekció formájában, naponta egyszer 3 napon át, azaz 1 ml készítmény/50 ttkg naponta.

Az ellés utáni 10 napon belül kialakuló heveny posztpartum metritisz kezelése: 1 mg ceftiofur/ttkg/nap szubkután injekció formájában, naponta egyszer 5 egymást követő napon át, azaz 1 ml készítmény/50 ttkg naponta.

A megismételt injekciót mindig az előzőtől eltérő helyre kell beadni.

A heveny posztpartum metritisz kezelésekor egyes esetekben kiegészítő terápiára lehet szükség.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés:

Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap.

Szarvasmarha:

Hús és egyéb ehető szövetek: 8 nap.

Tej: nulla nap.

► KISZERELÉS

250 ml



EFICUR®

50 mg/ml szuszpenziós injekció sertések és szarvasmarhák részére A.U.V. Ceftiofur

A minőségi alternatíva



Egyedüllálóan könnyen injektálható
Hidegben is megőrzi a minőségét



Evolúciós előny

Florgane

300 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.

► HATÓANYAG

1 ml tartalmaz: 300 mg florfenikol

► JAVALLAT

Szarvasmarha:

Szarvasmarhák florfenikolra érzékeny *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* és *Histophilus somni* okozta légzőszervi megbetegedéseinek metafilaxisára és gyógykezelésére. A betegségnek az állományban való jelenlétét előzetesen igazolni kell.

Sertés:

Sertések florfenikolra érzékeny *Actinobacillus pleuropneumoniae* és *Pasteurella multocida* okozta heveny légzőszervi megbetegedéseinek gyógykezelésére.

► ADAGOLÁS

Szarvasmarha:

Intramuszkulárisan alkalmazva, a nyaktájék izomzatába, egyszeri alkalommal: 30 mg florfenikol/ttkg (megfelel 1 ml/10 ttkg adagnak). Szarvasmarhának az egy helyre beadott mennyiség nem haladhatja meg a 15 ml-t. Szarvasmarha kezelésekor a nyak azonos oldalán, több helyre történő beadás esetén az egyes beadási helyek közötti távolság 15-20 cm legyen.

Sertés:

Intramuszkulárisan alkalmazva a fül mögötti területen, egyszeri alkalommal: 22,5 mg florfenikol/ttkg (megfelel 0,75 ml/10 ttkg adagnak).

Sertésnél az egy helyre beadott mennyiség nem haladhatja meg az 5 ml-t. 150 kg-nál nagyobb testtömegű szarvasmarhák és 65 kg-nál nagyobb testtömegű sertések kezelése esetén két vagy több helyre kell elosztani a beadandó mennyiséget, úgy, hogy szarvasmarhánál 15 ml-nél, sertésnél 5 ml-nél nagyobb mennyiség egy helyre ne kerüljön beadásra. A készítmény a nyak más-más oldalába is adható. A megfelelő dózis biztosítása érdekében, az aluladagolás elkerülésére, a testtömeget a lehető legpontosabban meg kell határozni. Használat előtt jól fel kell rázni. A beadáshoz steril, száraz tűt és fecskendőt kell használni. Minden egyes adag kiszívása előtt le kell törölni a gumidugót. A 100 ml-es üveg gumidugóját 25 alkalomnál többször nem szabad átszúrni. Ha a készítménnyel történő kezelés nem ad kielégítő eredményt, meg kell fontolni más kezelési mód alkalmazását.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha (hús és egyéb ehető szövetek): 37 nap. Tej: A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett.

Sertés: (hús és egyéb ehető szövetek): 22 nap.

► KISZERELÉS: 100 ml

FLORGANE® injekció
hatóanyag: florfenikol

Csak
egyszerűen

Innovatív vizes szuszpenzió
egyszeri kezeléssel



Gentamox

injekció A.U.V.

► **HATÓANYAG**

1 ml tartalmaz:
Amoxicillin-trihidrát 150 mg
Gentamicin (szulfát) 40 mg

► **JAVALLAT**

Sertések számára.

Actinobacillus pleuropneumoniae és egyéb amoxicillinre és gentamicinre érzékeny baktériumok által okozott fertőzések kezelésére.

► **ADAGOLÁS**

1 ml Gentamox inj./10 kg/naponta egyszer, 3 napon át.

Alkalmazás módja:
Mélyen intramuszkulárisan.

► **VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Sertés ehető szövetek: 75 nap.

► **KISZERELÉS**

100 ml

GENTAMOX

Az amoxicillin + gentamicin szinergista kombinációja

A Gentamox képlet

$$1 + 1 = 3$$



Qivitan

25mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarhák és sertések részére

► HATÓANYAG

Cefquinom 25 mg/ml

► JAVALLAT

Szarvasmarhák és sertések cefquinomra érzékeny Gram-pozitív és Gram-negatív mikroorganizmusok által okozott alábbi fertőzéseinek kezelésére:

Szarvasmarhák: *Pasteurella multocida* és *Mannheimia haemolytica* által okozott légzőszervi megbetegedések kezelésére. Digitális dermatitisz, fertőző bulbáris nekrosis és akut interdigitális nekrobacillózis (bűdös sántaság) kezelésére. Akut, szisztémás tünetekkel járó *E.coli* okozta masztitisz kezelésére.

Borjak: *E. coli* okozta szeptikémia kezelésére borjakban.

Sertések: *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis* és cefquinomra érzékeny egyéb organizmusok által okozott tüdő- és légúti fertőzések kezelésére. Masztitisz-metritisz-agalackia (MMA) szindróma kezelésére, amelynek kialakulásában szerepet játszanak *E. coli*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* baktériumok és cefquinomra érzékeny egyéb organizmusok.

Malacok: *Streptococcus suis* által okozott meningitisz miatti elhullások csökkentésére. *Streptococcus spp.*, *E. coli* vagy egyéb cefquinomra érzékeny organizmusok által okozott arthritisz kezelésére. *Staphylococcus*

hyicus okozta epidermitisz (enyhe vagy közepes súlyos léziók) kezelésére.

► ADAGOLÁS

Az összes kezelést intramuszkuláris injekcióban kell beadni. Használat előtt az üveget alaposan fel kell rázni.

Sertés:

2 mg cefquinom/ttkg (2 ml/25 ttkg). Naponta egyszer 3-5 egymást követő napon át. MMA esetén 2 mg cefquinom/ttkg (2 ml/25 ttkg). Naponta egyszer 2 egymást követő napon át.

Szarvasmarha:

1-2 mg cefquinom/ttkg (2-4 ml/50 ttkg). Naponta egyszer 3-5 egymást követő napon át. Akut, szisztémás tünetekkel járó *E.coli* masztitisz esetén: 1 mg cefquinom/ttkg (2 ml/50 ttkg). Naponta egyszer 2 egymást követő napon át.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha: hús és egyéb ehető szövetek 5 nap, tej: 24 óra

Sertés: hús és egyéb ehető szövetek 3 nap

► KISZERELÉS

100 ml

AMIKOR CSAK A HATÉKONYSÁG SZÁMÍT



QIVITAN inj.
cefquinome 25 mg/ml



Roxacin

100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.

► HATÓANYAG

1 ml tartalmaz: enrofloxacin 100 mg

► JAVALLAT

Szarvasmarha

A légzőszervek enrofloxacinra érzékeny alábbi kórokozók által okozott fertőzéseinek gyógykezelésére: *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Mycoplasma spp.*

Az emésztőszervek enrofloxacinra érzékeny alábbi kórokozók által okozott fertőzéseinek gyógykezelésére: *Escherichia coli*. Szeptikémia gyógykezelésére, melyet enrofloxacinra érzékeny *Escherichia coli* okoz. Kétévesnél fiatalabb szarvasmarha: ízületi gyulladásal társult akut mikoplazmózis kezelésére, melyet enrofloxacinra érzékeny *Mycoplasma bovis* törzs okoz.

Sertés

A légzőszervek enrofloxacinra érzékeny alábbi kórokozók által okozott fertőzéseinek gyógykezelésére: *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

A húgyszervek enrofloxacinra érzékeny alábbi kórokozók által okozott fertőzéseinek gyógykezelésére: *Escherichia coli*. Ellés utáni csökkent tejtermelés (PDS, MMA szindróma) gyógykezelésére, melyet enrofloxacinra érzékeny *Escherichia coli* és *Klebsiella*-fajok okoznak. Az emésztőszervek enrofloxacinra érzékeny alábbi kórokozók által okozott fertőzéseinek gyógykezelésére: *Escherichia coli*. Szeptikémia gyógykezelésére, melyet enrofloxacinra érzékeny *Escherichia coli* okoz.

► ADAGOLÁS

Intramuszkuláris, szubkután vagy intravénás alkalmazásra.

Szarvasmarha: 5 mg enrofloxacin/ttkg (1 ml állatgyógyászati készítmény/20 ttkg), naponta egyszer, 3-5 egymást követő napon át.

Kétévesnél fiatalabb szarvasmarha:

Izületgyulladásal társult akut mikoplazmózis kezelésére, melyet enrofloxacinra érzékeny *Mycoplasma bovis* törzs okoz: 5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek naponta egyszer, 5 napon át. Az injekciót lassan intravénásan vagy szubkután kell beadni. Egy helyre legfeljebb 10 ml adható bőr alá. Heveny, súlyos mastitis esetén, melyet *E. coli* okoz, 5 mg/ttkg (1 ml/20 ttkg) naponta egy alkalommal lassú intravénás injekcióban 2 napig. A második adag szubkután is adható.

Sertés: Intramuszkuláris alkalmazás.

2,5 mg enrofloxacin/ttkg (0,5 ml állatgyógyászati készítmény/20 ttkg) napi egy injekcióban, 3 egymást követő napon át.

Emésztőszervi megbetegedések vagy *Escherichia coli* okozta szeptikémia esetén: 5 mg/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek naponta egyszer, intramuszkuláris injekcióban, 3 napig. Sertéseknek az injekciót nyakba, a fül tövébe kell adni. Egy helyre legfeljebb 3 ml adható be intramuszkulárisan.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha:

Intravénás adagolást követően: hús és egyéb ehető szövetek 5 nap, tej 3 nap.

Szubkután adagolást követően: hús és egyéb ehető szövetek 12 nap, tej 4 nap.

Sertés:

Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap.

► KISZERELÉS: 100 ml

Roxacin

100 mg/ml injekció



A koncentráció ereje

10%-os enrofloxacin:
alacsonyabb dózissal ér el kiváló hatást



Selectan

300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.

► HATÓANYAG

1 ml tartalmaz: florfenikol 300 mg

► JAVALLAT

A florfenikolra érzékeny baktériumok által okozott betegségek kezelésére.

Szarvasmarha:

A *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* és a *Histophilus somni* által okozott légúti fertőzések kezelésére.

Sertés:

Az *Actinobacillus pleuropneumoniae* és a *Pasteurella multocida* törzsei által okozott légúti betegségek akut tüneteinek kezelésére.

► ADAGOLÁS

Szarvasmarha:

20 mg/ttkg (1 ml készítmény/15 kg), intramuszkulárisan, két alkalommal, 48 óra különbséggel.

A 150 kg-ot meghaladó testtömegű szarvasmarhák kezelése esetében az adagot elosztva kell beadni úgy, hogy az egy helyre beadott mennyiség ne haladja meg a 10 ml-t.

Sertés:

15 mg/ttkg (1 ml készítmény/20 kg), intramuszkulárisan a nyakizomba, két

alkalommal, 48 óra különbséggel.

A 60 kg-ot meghaladó testtömegű sertések kezelése esetében az adagot elosztva kell beadni úgy, hogy az egy helyre beadott mennyiség ne haladja meg a 3 ml-t.

A helyes dózis megállapítása és az aluldozírozás elkerülése érdekében a testtömeget a lehető legpontosabban kell megállapítani.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha:

Hús és egyéb ehető szövetek: 30 nap.
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett.

Sertés:

Hús és egyéb ehető szövetek: 18 nap.

► KISZERELÉS

250 ml



SELECTAN®

Florfenikol

Minőség megfizethető áron

A hideg sem állítja meg



Törhetetlen 250 ml-es műanyag palackban

Alacson viszkozitás:
gyors és könnyű injektálhatóság még a legnagyobb hidegben is

► HATÓANYAG

1 ml tartalmaz: 25 mg tulatromicin

► JAVALLAT

Sertések tulatromicinre érzékeny *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Haemophilus parasuis* és a *Bordetella bronchiseptica* okozta légzőszervi betegség (SRD) gyógykezelésére és metafilaxisára. Metafilaxis céljából a készítményt kizárólag akkor szabad alkalmazni, ha az állományban előzetesen megállapították a betegség jelenlétét, és a betegség várhatóan 2-3 napon belül kialakul a sertésekben.

► ADAGOLÁS

Sertés: intramuszkuláris alkalmazás. Egyszeri intramuszkuláris injekció a nyaktájon beadva, 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/10 ttkg mennyiségnek). A 40 kg-nál nagyobb testtömegű sertéseknél úgy kell elosztani az adagot, hogy az egy helyre beadott mennyiség ne haladja meg a 4 ml-t.

Légzőszervi megbetegedéseknél a kezelést a megbetegedés korai szakaszában ajánlott elvégezni és a kezelés hatását a beadást követő 48 órában javasolt értékelni. Ha a légzőszervi betegség klinikai tünetei továbbra is fennállnak vagy súlyosbodnak, vagy visszaesés tapasztalható, akkor antibiotikumot kell váltani és a kezelést addig folytatni, amíg a klinikai tünetek megszűnnek.

A helyes adagolás biztosítása és az aluldozírozás elkerülése érdekében a lehető legpontosabban kell meghatározni a kezelt állatok tömegét.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek 13 nap.

► KISZERELÉS

100 ml és 250 ml

Tulatromicin oldatos injekció

AZ EGYSZERI KEZELÉS
LEHETŐSÉGE

TULLAVIS

FORDULJUNK SZÉLIRÁNYBA

Vitrolázz velünk

- Gyors és tartós hatás egy készítményben
- Széles hatásspektrum
- Lokális gyulladáscsökkentő hatás a tüdőben
- Kiemelkedő hatékonyság a legfontosabb légzőszervi kórokozókkal szemben

LIVISTO



Tullavis

100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok számára A.U.V.

► HATÓANYAG

1 ml tartalmaz: 100 mg tulatromicin

► JAVALLAT

Szarvasmarha: A tulatromicinre érzékeny *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* és *Mycoplasma bovis* okozta légzőszervi betegség (BRD) gyógykezelésére és metafilaxisára. Metafilaxis céljából a készítményt kizárólag akkor szabad alkalmazni, ha az állományban előzetesen megállapították a betegség jelenlétét. Tulatromicinre érzékeny *Moraxella bovis* okozta fertőző kötő- és szaruhártya gyulladás (IBK) gyógykezelésére.

Sertések: Tulatromicinre érzékeny *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Haemophilus parasuis* és a *Bordetella bronchiseptica* okozta légzőszervi betegség (SRD) gyógykezelésére és metafilaxisára.

Juh: A *Dichelobacter nodosus* virulens törzsei által okozott fertőző csülökirha-gyulladás (lábvégrothadás, büdös sántaság) korai stádiumában való gyógykezelésére.

► ADAGOLÁS

Szarvasmarha: szubkután alkalmazás. Egyszeri szubkután injekció 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek).

Úgy kell elosztani az adagot, hogy az egy helyre beadott mennyiség ne haladja meg a 7,5 ml-t.

Sertés: intramuszkuláris alkalmazás.

Egyszeri intramuszkuláris injekció a nyaktájon beadva, 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek).

A 80 kg-nál nagyobb testtömegű sertések-nél úgy kell elosztani az adagot, hogy az egy helyre beadott mennyiség ne haladja meg a 2 ml-t.

Juh: intramuszkuláris alkalmazás.

Egyszeri intramuszkuláris injekció a nyaktájon beadva, 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek).

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 22 nap.

Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap.

Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 16 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett. Nem alkalmazható a várható ellés előtti 2 hónapon belül azoknál a vemhes állatoknál, amelyek emberi fogyasztásra szánt tejet fognak termelni.

► KISZERELÉS

100 ml



Tulatromicin oldatos injekció

AZ EGYSZERI KEZELÉS
LEHETŐSÉGE

TULLAVIS

FORDULJUNK SZÉLIRÁNYBA

Vitrolázz velünk

- Gyors és tartós hatás egy készítményben
- Széles hatásspektrum
- Lokális gyulladáscsökkentő hatás a tüdőben
- Kiemelkedő hatékonyság a legfontosabb légzőszervi kórokozókkal szemben

LIVISTO

100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok számára A.U.V.

► HATÓANYAG

1 ml tartalmaz:tulatromicin 100 mg

► JAVALLAT

Szarvasmarha, sertés és juh számára.

Szarvasmarha: tulatromicinre érzékeny *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* és *Mycoplasma bovis* törzsek okozta, szarvasmarhák légzőszervi betegsége (BRD) gyógykezelésére és metafilaxisára. Tulatromicinre érzékeny *Moraxella bovis* törzsek okozta fertőző keratokonjunktivitisz (IBK) gyógykezelésére.

Sertések: Tulatromicinre érzékeny *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Haemophilus parasuis* és a *Bordetella bronchiseptica* okozta légzőszervi betegség (SRD) gyógykezelésére és metafilaxisára. Az állatgyógyászati készítmény csak akkor alkalmazható, ha a betegség jelenlétét az állományban megállapították. Az állatgyógyászati készítményt csak akkor szabad alkalmazni, ha 2-3 napon belül várható a betegség klinikai tünetekben történő megnyilvánulása a sertésekben.

Juh: szisztémás kezelést igénylő virulens *Dichelobacter nodosus* okozta fertőző pododermatitis (panaritium) korai stádiumában történő kezelésére.

► ADAGOLÁS

Szarvasmarha: szubkután alkalmazás.

Egyszeri szubkután injekció 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek).

Úgy kell elosztani az adagot, hogy az egy helyre beadott mennyiség ne haladja meg a 7,5 ml-t.

Sertés: intramuszkuláris alkalmazás.

Egyszeri intramuszkuláris injekció a nyaktájon beadva, 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek).

A 80 kg-nál nagyobb testtömegű sertések-nél úgy kell elosztani az adagot, hogy az egy helyre beadott mennyiség ne haladja meg a 2 ml-t.

Juh: intramuszkuláris alkalmazás.

Egyszeri intramuszkuláris injekció a nyaktájon beadva, 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek).

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 22 nap.

Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap.


Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 16 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett. Nem alkalmazható a várható ellés előtti 2 hónapon belül azoknál a vemhes állatoknál, amelyek emberi fogyasztásra szánt tejet fognak termelni.

► KISZERELÉS: 100 ml



VETDRAX 100 mg/ml




10%-os tulatromicin injekció





VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK



Betamint

oldat valamennyi állatfaj részére



► ÖSSZETÉTEL

Vízmentes betain (3a920)..... 250g/l
C-vitamin (3a300)..... 90g/l
Mentol (2b02015)..... 5 g/l
Szorbit, kalcium-klorid, nátrium-klorid,
magnézium-klorid, kálium-klorid és al-
gakivonat (spirulina).

► JAVALLAT

A hőstressz megelőzésére és a hőstressz okozta károk mérséklésére.

A Betamint kiegészítő takarmány, összetételénél fogva a takarmányozáson keresztül biztosítja a nagy melegben az állatok számára a párologással, izzadással elvesztett elektrolitokat, betain tartalma természetes módon növeli a nagy melegben csökkenő étvágyat és mentolos ízesítése révén az állatok szívesen fogyasztják.

Használatával nő a takarmányfelvétel.

► ADAGOLÁS

1-2 liter BETAMINT/1.000 liter ivóvíz.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nincs.

► KISZERELÉS

1 liter, 5 liter

Tökéletes megoldás a hőstressz ellen



Chicktonic

folyékony kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj részére

► HATÓANYAG

Aminosavak, vitaminok, provitaminok és olyan kémiai jól meghatározott anyagok, amelyeknek a vitaminokhoz hasonló hatásuk van:

A-vitamin 2.500.000 NE/l; D3-vitamin 500.000 NE/l; D-pantenol 15 g/l; B2-vitamin 4 g/l; E-vitamin 3,75 g/l; B1-vitamin 3,5 g/l; B6-vitamin 2 g/l; Kolin-klorid 400 mg/l; K3-vitamin 250 mg/l; B12-vitamin/ciano-kobalamin, 10 mg/l; Biotin 2 mg/l, DL-metionin 2, 5 g/l; Lizin 2,5 g/l, aromaanyagok keveréke, 12 g/l

Növényi eredetű hidrolizált fehérje (Lizin, Metionin, Glutaminsav, Alanin, Arginin, Aszparaginsav, Cisztin, Glicin, Hisztidin, Izoleucin, Leucin, Fenil-alanin, Prolin, Szerin, Valin, Treonin, Triptofán, Tirozin)

► JAVALLAT

Valamennyi állatfaj részére.

A termék komplex összetételével növeli a takarmányfelvételt, javítja a termelési paramétereket.

Fokozza az étvágyat, támogatja az anyagcserét.

Fenntartja az idegrendszer és az immunrendszer teljesítményét.

Támogatja a szaporodást és az

izomrendszer fejlődését, valamint javítja a tojáshéj minőségét.

Hatóanyagai segítik a maximális teljesítmény elérését.

► ADAGOLÁS

1-2 ml/liter ivóvíz, 5-7 napon át.

Kerülni kell az olyan ivóvízzel történő egyidejű alkalmazást, amelyhez kolin-kloridot adtak.

Az adalékanyag ivóvízen keresztül történő felhasználása során kerülni kell a túlzott fehérje bevitelt.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nincs.

► KISZERELÉS

100 ml, 1 liter, 5 liter, 25 liter



CHICKTONIC

100 ml, 1l, 5l, 25l

AZ ERŐNÖVELŐ...

LIVISTO



Veled...

▶ **HATÓANYAG**

100% C-vitamin, aszkorbinsav 1000 mg/g

▶ **JAVALLAT**

Haszonállatok és a baromfifélék C-vitamin igényének kielégítésére.

A stressz és kifejezetten a hő-stressz kedvezőtlen hatásainak csökkentésére és megelőzésére.

▶ **ADAGOLÁS**

Szájon át, ivóvízben oldva.

Baromfi:

1. héten 3g-, 2. héten 6g-, 3. héten 10g készítmény/1000 állat/nap, vagy 0,5-1,5 g/liter ivóvíz, 4-7 napon át

Szarvasmarha, ló:

2-5 g/állat/nap 4-7 napon át.

Juh, kecske, sertés:

1-2 g/állat/nap 4-7 napon át.

▶ **VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Nincs.

▶ **KISZERELÉS**

1 kg, 5 kg, 25 kg

DUNAVIT-C

Immunrendszer támogatás
Stresszvédelem100%
gyógyszerminőségű
aszkorbinsav

► HATÓANYAG

E-vitamin 10 g/100 ml
Szelén (Nátrium-szelenit) 50 mg/100 ml

► JAVALLAT

E-vitamin és szelén hiány megelőzésére és kezelésére gazdasági haszonállatok részére.

A szelén és az E-vitamin együttes alkalmazása jelentősen felerősíti a szervezetben az antioxidáns hatást.

► ADAGOLÁS

Szájon át, ivóvízbe vagy takarmányba keverve, 5 egymást követő napon át.

Általános adag:

1 ml/5-10 ttkg vagy 1 liter/1000 liter ivóvíz (1 ml/liter ivóvíz).

Takarmányba keverve:

2 liter/tonna takarmány.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nincs.

► KISZERELÉS

1 liter, 5 liter

ESVEX**N**
Nutritional

**E-vitamin és
szelén kiegészítő,
kiemelkedően magas
koncentrációval**





Polivit Aminoacidos Liquido

folyékony kiegészítő takarmány

► HATÓANYAG

Vitaminok, aminosavak, glicerín, élesztő és alkotórészei, propilén-glikol, szorbit, nátrium-klorid

Vitaminok/ml:

Vitaminok: tiamin-hidroklorid (B1-vitamin 3a820) 1,5 mg, B2-vitamin (riboflavin-5' foszfát észter mononátriumsó) 0,2 mg, Piridoxin hidroklorid (B6-vitamin, 3a831) 2,5 mg, B12-vitamin 20 mcg, Aszkorbin-sav (C-vitamin, 3a300) 25 mg, L-mena-dion-nátrium-biszulfid (K3-vitamin, 3a710) 1,5 mg, Niacinamid (3a315) 20 mg, Kalcium-D pantotenát (3a841) 5 mg

Aminosavak/ml:

Alanin 6,07 mg, Arginin 4,90 mg, Aszparaginsav 8,40 mg, Glutaminsav 14,48 mg, Cisztein 1,40 mg, Fenilalanin 4,44 mg, Glicin 5,60 mg, Hisztidin 1,87 mg, Izoleucin 4,44 mg, Leucin 7,47 mg, Lizin 4,0 mg, Metionin 2,58 mg, Prolin 4,90 mg, Szerin 6,30 mg, Tirozin 2,80 mg, Treonin 4,90 mg, Valin 6,54 mg

Beltartalom

Nyersfehérje 9,3%; Nyerszsír 45%; Nyersrost 5%; Nedvességtartalom 30 %; Nyershamu 4%; Nátrium 0,5%; Lizin 0,4%;

Metionin 0,2%

► JAVALLAT

Baromfi, nyúl, szarvasmarha, sertés, juh és kecske részére.

A készítmény kiegyensúlyozott aminosav és vitamin tartalma fokozza a takarmány értékesülését, támogatja a növekedést, a tojásrakást, és általában a teljesítőképességet. Használatával javulnak a szaporodási és a termelési mutatók.

► ADAGOLÁS

Baromfi, nyúl, szarvasmarha, sertés, juh és kecske:

(0,5)1-2 ml/liter ivóvíz, 5-7 napon keresztül.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ


Nincs.

► KISZERELÉS

5 liter



POLIVIT AMINOACIDOS LIQUIDO



**Kiegyensúlyozott aminosav és vitamin tartalmú készítmény
a hatékony termelés támogatásához**



Polivit B complex + AD₃E

folyékony takarmány előkeverék

► HATÓANYAG

Vitaminok, szorbit, propilénglikol, glicerin, nátrium-klorid

Vitaminok/ml: Retinil-palmitát (A-vitamin, 3a672b) 10 000 NE; Kolekalciferol (D3-vitamin, 3a671) 200 NE; alfatoferol (E-vitamin 3a700) 2 NE; Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin, 3a820) 5 mg; B2-vitamin (riboflavin-5' foszfát észter mononátriumsó) 150 µg; Piridoxin hidroklorid (B6-vitamin, 3a831) 4 mg; B12-vitamin 20 mcg; L-menadion-nátrium-biszulfit (K3-vitamin, 3a710) 1,5 mg; Aszkorbinsav (C-vitamin, 3a300) 40 mg; Niacinamid (3a315) 20 mg; Kalcium-D pantotenát (3a841) 10 mg

Beltartalom:

Nyersfehérje 3%; Nyerszsír 35%; Nyersrost 0%; Nedvességtartalom 55 %; Nyer-shamu 3%; Nátrium 1%; Lizin 0%; Metionin 0%

► JAVALLAT

Baromfi, nyúl, szarvasmarha, sertés, juh, ló és kecske részére.

Kiegészítő takarmány a napi takarmány-bevitelhez, amely a növekedéshez, a tojásrakáshoz, a termékenységhez,

a gyógyuláshoz és a magas termelési időszakokban szükséges vitaminokat tartalmazza.

► ADAGOLÁS

Ivóvízbe adagolva legalább 5 napig.

Baromfi: 1 ml/liter ivóvízbe

Nyúl: 1 ml/liter ivóvízbe

Malac: 4 ml/állat

Koca és kanok: 10 ml/állat

Borjú és csikó: 8 ml/állat

Szarvasmarha és lovak: 20 ml/állat

Bárányok és gida: 4 ml/állat

Juh és kecske: 8 ml/állat

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nincs.

► KISZERELÉS

5 liter

POLIVIT B COMPLEX

Zsírban oldódó vitaminok és B-vitaminok kiegyensúlyozott keveréke



Promotor 43

por alakú kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj részére

► HATÓANYAG

Vitaminok, aminosavak
Beltartalom 1 kg termékben:

Vitaminok, provitaminok és analógjaik: A-vitamin (3a672a) 5.250.000 NE; D3-vitamin (3a671) 625.000 NE; E-vitamin (3a700, 50%-os alfa-tokoferol tartalom) 3.000 NE; K3-vitamin (3a710) 4 g; Niacin (3a314) 12 g; Kalcium-pantotenát-D (3a841) 2,5 g; B6-vitamin (3a831) 0,60 g; B2-vitamin 1,2 g; B1-vitamin (3a820) 0,7g; Biotin (3a880) 0,002 g; B12-vitamin 0,0025 g; C-vitamin (3a300) 7,5 g; Folsav (3a316) 0,2 g

Összetétel:

Dextróz, laktóz, kazein, vitaminok, aminosavak, aminosav-sók és analógjaik: Ipari tisztaságú DL-Metionin (3c301) 200 g; Lizin (3.2.3) 25 g

Aromaanyagok keveréke: 1,6 g

► JAVALLAT

Valamennyi állatfaj részére.

Takarmányozási hiányosságok és rendelkezési problémák megelőzésére, valamint általános gyengeség és lábadozás idején. Intenzív reprodukciós ciklusban. Aminosav és/vagy vitamin hiányok esetén.

► ADAGOLÁS

Baromfi (14 nap alatt):

2 g/kg takarmány, 5 napon át.

Baromfi (14 nap felett):

1,9 g/kg takarmány, 5 napon át.

Nyúl:

3 g/kg takarmány, 7 napon át.

Szarvasmarha, ló, juh, kecske, sertés:

1 kg/tonna takarmány, vagy 5 g készítmény/10 ttkg, 5 napon át.

Amennyiben az előkeveréket ivóvízhez adagoljuk, ügyelni kell a pontos adagolásra. A felbontott tasak lezárt állapotában, hűtött helyen tárolandó.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nincs.

► KISZERELÉS

100 g, 1 kg

Promotor 43

Klasszikus termék, amely 30 éve nap, mint nap bizonyít



**VITAMINOK ÉS
AMINÓSAVAK
STABILIZÁLT ÉS
KIEGYENSÚLYOZOTT
ELEGYE**



Promotor L 47.0

folyékony kiegészítő takarmány valamennyi állatfaj részére

► HATÓANYAG

Vitaminok, aminosavak

Analitikai összetevők:

Nyersfehérje: 13,5 - 17,0%, Nyersolaj és zsír: 0%, Nyersrost: 0%, Nyershamu: 0,5 - 1,0%, Nedvesség tartalom: 75 - 85%, Metionin: 0,18%, Lizin: 0,76%, Kalcium, nátrium, foszfor, magnézium: 0%.

1000 ml tartalmaz: Vitaminok, provitaminok és analógjaik: Nikotinamid (3a315): 16,25 g, D-pantenol (3a842): 7,5 g, B1 vitamin: 1,75 g, B2 vitamin: 2,5 g, B6 vitamin (3a831): 1,125 g, Biotin: 0,001 g,

Aminosavak, aminosav-sók és analógjaik: D,L-Metionin, tiszta (3c301): 0,18%, Lizin (3.2.3): 0,76%

Összetétel:

Élesztő hidrolizátum* 470 ml/1000 ml, dextróz 0,1 g/1000 ml.

*A növényi szubsztráton termesztett élesztő hidrolizátum összetétele 1 liter Promotor L 47.0-ben: Alanin: 7,4 g, Arginin: 8,6 g, Aszparaginsav: 10,0 g, Fenilalanin: 5,8 g, Cisztin: 4,6 g, Glicin: 10,3 g, Glutaminsav: 17,8 g, Hisztidin: 1,5 g, Izoleucin: 5,6 g, Leucin: 8,7 g, Lizin: 7,6 g, Metionin: 1,8 g, Prolin: 11,8 g, Szerin: 12,0 g, Treonin: 6,2 g, Tirozin: 3,1 g, Valin: 9,3 g.

► JAVALLAT

Valamennyi állatfaj részére.

Takarmányozási hiányosságok és rendelkezési hiányosságok, valamint általános gyengeség és lábadozás idején. Intenzív reprodukciós ciklusban.

Aminosav és/vagy vitamin hiányok (B vitamin csoport) esetén.

A vitaminok minősége a minőség-megőrzési idő végéig garantált.

► ADAGOLÁS

Szájon át, ivóvízben oldva.

Naponta friss oldatot kell készíteni.

Baromfi: 1 ml/liter ivóvíz, 5 napon át.

Méhek: 5 ml/liter cukoroldat.

Nyúl: 2 ml/liter ivóvíz, 7 napon át.

Többi állatfaj: 2 ml/10 ttkg/nap, 4-5 napon át.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nincs.

► KISZERELÉS

1 liter, 5 liter

Promotor L 47.0



**VITAMIN ÉS AMINÓSAV
TARTALMÚ FOLYÉKONY
KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY**

C CALIER



INJEKCIÓS VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK



Dalmafort

15mg/ml + 18.22 mg/ml emulziós injekció sertések és szarvasmarhák részére

► HATÓANYAG

béta-karotin 15 mg, dl- α -tokoferol (E-vitamin) 18,22 mg (amely megfelel 20 mg dl- α -tokoferol-acetátnak).

► JAVALLAT

Kocák és tehenek reprodukív aktivitására gyakorolt javító hatása, antioxidáns hatása és immunrendszer szabályozó képessége miatt javallott.

► ADAGOLÁS

Intramuszkulárisan alkalmazandó.

KOCÁK:

A reprodukív aktivitás javítása.

7 ml DALMAFORT/100 ttkg (ez megközelítőleg 1 mg/kg béta-karotinnal és 1,3 mg/kg E-vitaminnal egyenértékű) 3-4 nappal az inszeminálás előtt.

Antioxidáns aktivitás és az immunrendszer szabályozása.

7 ml DALMAFORT/100 ttkg (ez megközelítőleg 1 mg/kg béta-karotinnal és 1,3 mg/kg E-vitaminnal egyenértékű) nagyjából 10 nappal ellés előtt.

TEHENEK:

A reprodukív aktivitás javítása.

3,5-7 ml DALMAFORT/100 ttkg (ez megközelítőleg 0,5-1 mg/kg béta-karotinnal és 0,6-1,3 mg/kg E-vitaminnal egyenértékű) hozzávetőlegesen 30 nappal ellés után, a petefészek-működés helyreállításának

serkentésére.

Azoknál az állatoknál, melyek ellés után 60-70 nappal nem mutatják ivarzás semmilyen jelét, vagy petefészek hipotrófia tüneteit mutatják, valamint méhfertőzés esetén a kezelést meg kell ismételni.

3,5-7 ml DALMAFORT/100 ttkg (ez megközelítőleg 0,5-1 mg/kg béta-karotinnal és 0,6-1,3 mg/kg E-vitaminnal egyenértékű) a szárazonállás második hónapjának elején.

Antioxidáns aktivitás és az immunrendszer szabályozása.

3,5-7 ml DALMAFORT/100 ttkg (ez megközelítőleg 0,5-1 mg/kg béta-karotinnal és 0,6-1,3 mg/kg E-vitaminnal egyenértékű) a szárazonállás második hónapjának elején.

Mindkét fajnál, valamennyi javallat esetén, annyiszor kell megismételni a kezelést, ahányszor az állatorvos azt szükségesnek ítéli.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Kocák: hús és egyéb ehető szövetek:

0 nap,

Tehenek: hús és egyéb ehető szövetek:

0 nap, tej: 0 óra

► KISZERELÉS

100 ml és 250 ml



Dalmafort

β -karotin + E-vitamin



Új korszak
a szarvasmarha-tenyésztésben!



► HATÓANYAG

E-vitamin 150 mg/ml
Szelén (Na-szelenit formában) 0,5 mg/ml

► JAVALLAT

Szarvasmarha és juh vázizom-elfajulásának (fehérizom betegség) és **sertések** szívizom-elfajulásának (szederszív betegség, mulberry heart disease), valamint máj-elfajulásának megelőzésére és kezelésére.

Meddőségi- és reprodukciós zavarok megelőzésére és kezelésére.

Általában az E-vitamin és a szelén hiány okozta betegségek kezelésére.

► ADAGOLÁS

Használat előtt felrázandó!

Intramuszkuláris alkalmazásra. Szükség esetén 2 hét múlva megismételhető. Az adagolást pontosan be kell tartani, mert a túladagolt szelén toxikus lehet.

Juh, bárány:**Megelőzésre:**

1 ml Esvex injekció A.U.V./15 ttkg.

Kezelésre:

2 ml Esvex injekció A.U.V./15 ttkg.

Juhok esetében a vemhesség idején, valamint bárányoknak újszülött korban két kezelés javasolt, 2 hét különbséggel.

Reprodukciós zavarok esetén:

2 ml Esvex injekció A.U.V./15 ttkg.

Szarvasmarha, borjú:**Megelőzésre:**

1 ml Esvex injekció A.U.V./25 ttkg.

Kezelésre:

2 ml Esvex injekció A.U.V./25 ttkg.

Sertés (valamennyi korcsoportban):**Kezelésre:**

1 ml Esvex injekció A.U.V./25 ttkg.

Kocáknak az ellés körüli időszakban két kezelés javasolt, 2 hét különbséggel.

Reprodukciós zavarok esetén:

5 ml Esvex injekció A.U.V./100 ttkg.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha, juh, sertés-hús és egyéb ehető szövetek: nulla nap.

► KISZERELÉS

100 ml

ESVEX

100 ml injekció

N

Nutritional

**s.p.® veterinaria**

**Az első és egyetlen komplex injekció
a szelén és E-vitamin hiány megelőzésére és kezelésére**

VITAMIN

E

MINERAL

Se

Metabolase

injekció szarvasmarha, bivaly, ló, sertés, juh, kecske, nyulak, kutya és macska részére

► HATÓANYAG

L-karnitin 5 mg, Tioktánsav 0,2 mg, Piridoxin-hidroklorid (B6 vitamin) 0,15 mg, Cianokobalamin (B12 vitamin) 0,03 mg, N-acetil-DL-metionin 20 mg, L-arginin 2,4 mg, L-ornitin 1,2 mg, L-citrullin 1,2 mg, L-lizin 0,5 mg, Glicin 1,5 mg, Aszparaginsav 1,5 mg, Glutaminsav 1,5 mg, Fruktóz 50 mg, Szorbit 80 mg

► JAVALLAT

Ez az állatgyógyászati készítmény méregtelenítő és kimerültség elleni szerként javallott fizikai stressz és lábadozás állapotában.

► ADAGOLÁS

Intravénásan, szubkután vagy intraperitoneálisan alkalmazandó az alábbi adagolás szerint:

Szarvasmarha, bivaly, felnőtt ló, felnőtt sertés: 250–500 ml naponta kétszer, intravénás, szubkután vagy intraperitoneális úton.

Borjú, bivalyborjú, csikó, felnőtt juh, kecske: 250 ml naponta kétszer, intravénás, szubkután vagy intraperitoneális úton.

Sertés és hízósertés: 20–40 ml/10 ttkg naponta kétszer, szubkután úton.

Bárány, gida: 20–40 ml/10 ttkg naponta kétszer, intravénás, szubkután vagy intraperitoneális úton.

Nyúl, macska: 2–4 ml/ttkg naponta kétszer, szubkután úton, több injekciós helyre elosztva.

Kutya: 2–4 ml/ttkg naponta kétszer, intravénás vagy szubkután úton.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha, bivaly, ló, juh és kecske: hús és ehető melléktermékek:

0 nap, tej: 0 óra.

Sertés, nyúl: hús és ehető melléktermékek: 0 nap.

► KISZERELÉS

500 ml



Teljes megoldás

egyetlen injekcióban

az anyagcsere támogatására

Metabolase





Toco Selenio

Oldatos injekció

► HATÓANYAG

α -tokoferol-acetát (E-vitamin). 80 mg
Szelén (nátrium-szelenit formában) 0,8 mg

► JAVALLAT

A következő E-vitamin- és/vagy szelénhiány okozta kórképek megelőzése és kezelése:

Szarvasmarha, juh: vázizom-elfajulás (fehérizom betegség).

Sertés szívizom-elfajulásának (szeder-szív betegség-mullberry heart disease), valamint máj-elfajulásának megelőzésére és kezelésére.

Általánosan az E-vitamin és szelén hiány okozta betegségek kezelésére.

► ADAGOLÁS

Használat előtt alaposan felrázandó.
Intramuszkuláris vagy szubkután alkalmazásra.

Szarvasmarha: 0,03-0,06 mg Se + 3-6 mg E-vitamin/ttkg. (3,75-7,5 ml/100 ttkg).

Juh: 0,06 mg szelén + 6 mg E-vitamin/ttkg (1,5 ml/20 ttkg), javasolt a vemhesülést követő harmadik hónap után a bárányok E-vitamin- és szelénhiányának

megelőzésére.

Sertés: A kocáknak 0,06 mg szelén + 6 mg E-vitamin/ttkg (7,5 ml/100 ttkg), a malacok E-vitamin és a szelén hiányának megelőzésére.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha: hús és egyéb ehető szövetek 34 nap.

Juh és sertés hús és egyéb ehető szövetek: 16 nap.

Használata nem engedélyezett emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál.

► KISZERELÉS

100 ml



TOCO SELENIO

100 ml injekció



Az elérhető legmagasabb **E-vitamin** tartalmú **szelénnel** kombinált készítmény.

Az **E-vitamin-** és a **szelénhiány** megelőzésére és kezelésére.

Gyors és tartós hatás egy készítményben.



Uniferon

200 mg/ml oldatos injekció malacok részére A.U.V.

► HATÓANYAG

1 ml oldatos injekció tartalmaz 200 mg vas (III) dextránt, (vas-dextrán komplex formájában)

► JAVALLAT

Malacok vashiányos anémiájának megelőzésére és kezelésére.

► ADAGOLÁS

Mély intramuszkuláris vagy szubkután alkalmazásra.

Megelőzésre:

1-4 napos korban 1 ml készítményt kell szubkután, vagy a hátsó lábba mélyen az izomba beadni.

Kezelésre:

1 ml készítményt kell szubkután, vagy a hátsó lábba mélyen az izomba beadni.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: nulla nap.

► KISZERELÉS

200 ml

uniferon®
Vas (III) dextrán

No.1
VAS INJEKCIÓ



**Prémium vaskészítmény
a kétszeri vasazás lehetőségével**



Vigophos

100 mg/ml + 0,05 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák részére

► **HATÓANYAG**

Butafoszfán 100,00 mg/ml
Cianokobalamin 0,05 mg/ml

► **VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Hús és egyéb ehető szövetek: nulla nap.
Tej: nulla óra.

► **JAVALLAT**

Másodlagos ketózis támogató kezelésére (pl.: oltógyomor helyzetváltozáskor).

► **KISZERELÉS**

100 ml

► **ADAGOLÁS**

Intravénás alkalmazásra.

Szarvasmarha:

5 mg butafoszfán és 2,5 µg cianokobalamin ttkg-onként, amely napi 5 ml/100 ttkg-nak felel meg, 24 órás időközönként három egymást követő napon.

A klasszikus kombináció

Butafoszfán + Cianokobalamin
oldatos injekció
szarvasmarhák részére

VIGOPHOS

A MÁSODLAGOS KETÓZIS
HATÉKONY KEZELÉSÉRE





SZARVASMARHA TŐGYINFÚZIÓK ÉS MÉHKEZELŐ SZEREK



Fatroseal

2,6 g-os intramammális szuszpenzió szárazon álló tehenek számára

► HATÓANYAG

Nehéz bizmut-szubnitrát, 2,6 g (egyenértékű 1,858 g nehéz bizmuttal)

► JAVALLAT

Új tőgyfertőzések kialakulásának megelőzése a szárazon állás időszakában.

Azokon a tehenek, amik a szubklinikai tőgygyulladástól valószínűleg mentesek, a készítmény önmagában használható a szárazra állítási protokoll részeként és a tőgygyulladás elleni védekezésre..

► ADAGOLÁS

Kizárólag intramammális alkalmazás.

Közvetlenül a laktációs időszak utolsó fejését követően (szárazra állításkor) kell minden tőgynegyedbe egy fecskendőnyi készítményt bejuttatni.

A készítmény befecskendezését követően a csecsbimbót vagy a tőgyet tilos masszírozni, mivel az a cél, hogy a zárányanyag magában a csecsbimbóban maradjon és ne jusson be a tőgybe. Annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a kezelés utáni tőgygyulladás

lehetőségét, gondoskodni kell arról, hogy ne kerülhessenek kórokozók a tőgybimbóba. Elengedhetetlen a szigorúan aszeptikus technikák alkalmazása a készítmény befecskendezése során, mivel annak nincs antimikrobiális aktivitása.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: nulla nap.

Tej: nulla óra.

► KISZERELÉS

60 fecskendőt + 60 törlőkendőt tartalmazó kartondoboz



Fatroseal[®] BIZMUT-SZUBNITRÁT

INTRAMAMMÁLIS SZUSZPENZIÓ
SZÁRAZON ÁLLÓ TEHENEK SZÁMÁRA

Könnyű beadás
Kiváló tömítőhatás



Fatroximin DC

100 mg/5 ml intramammális kenőcs szarvasmarhák és bivalyok részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Rifaximin 100 mg/5 ml

► JAVALLAT

Rifaximinre érzékeny *Staphylococcus aureus* (penicillin-rezisztens törzsek is), *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Trueperella pyogenes* törzsek által okozott szubklinikai tőgygyulladás kezelésére és a szárazon állás alatti új fertőzések megelőzésére **tejlő tehéneknek és bivalyoknak**.

► ADAGOLÁS

Intramammális alkalmazás.

Egy 5 ml-es előretöltött fecskendő teljes tartalmát kell egy tőgynegyedbe bejuttatni (megfelel 100 mg rifaximin/tőgynegyed kezelésnek). A kezelést közvetlenül az utolsó fejés után kell elvégezni. Az előretöltött fecskendő ún. "Twinsert" rendszerrel van ellátva. A "Twinsert" rendszer lehetővé teszi, hogy a tőgyinfúziót a bimbócsatornába akár részlegesen, akár teljesen (mélyen) feltolva alkalmazzassuk a kezelési kívánalmaknak megfelelően. Az intramammális kezelések során mindig a részleges alkalmazást részesítsük

előnyben, mivel így kisebb az újabb tőgyfertőzések kialakulásának veszélye. A részleges alkalmazás során a tőgyinfúziót csak egy pár milliméterig toljuk fel a bimbócsatornába, ami nem érinti így a szűkítő izomzatot, és a keratin réteget sem károsítja, azonban a tőgyinfúzió tartalma teljes egészében bejuttatható a bimbócsatornába.

A teljes (mély) alkalmazás sérült tőgybimbó miatti nyugtalan tehen kezelésére esetén lehet indokolt.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek:
nulla nap.

A kezelt állatok tőgye emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tej: nulla óra az ellés után, ha a szárazon állás időszaka egyenlő, vagy hosszabb, mint 35 nap.

35 nap a kezelés után, ha a szárazon állás időszaka rövidebb, mint 35 nap.

► KISZERELÉS

60 db



FATROXIMIN

**INTRAMAMMALIS KENŐCS
SZÁRAZON ÁLLÓ
TEHENEK RÉSZÉRE**



Rifaximin, a 100%-ban a tőgyben ható antibiotikum



Fatroximin IU

100 mg/13,4 g intrauterin emulzió szarvasmarhák és lovak részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Egy 13,4 g-os palack tartalmaz:
Rifaximin 100 mg

► JAVALLAT

Tehén és kanca női nemi szerveinek bakteriális fertőzéseinek kezelésére: a rifaximinra érzékeny kórokozók által okozott akut és krónikus endometritis, pyometra, metritis, cervicitis, vulvovaginitis kezelésére Gram-pozitív baktériumok és bizonyos Gram-negatív baktériumok esetén, beleértve az anaerobokat (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Trueperella pyogenes*, *Clostridium spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium spp.*).

► ADAGOLÁS

Használat előtt alaposan rázza fel.
A habot intrauterin módon vagy a hüvelybe bejuttatva kell alkalmazni.

Tehén

Akut és krónikus endometritis, pyometra, metritis, cervicitis: 50-200 mg (megfelel ½ - 2 palacknak) egyszerre, egyetlen adagban, a kezelendő méh méretének megfelelően.

Pyometra esetén a méh üregének előzetes kiürítése után kell a kezelést elvégezni. Vulvovaginitis kezelése esetén: 100 mg + 100 mg (megfelel 1 + 1 palacknak), 24 órás különbséggel.

Nem emberi fogyasztásra szánt kanca

Akut és krónikus endometritis: 100-400 mg (megfelel 1-4 palacknak) egyszeri adagolással, a kezelendő méh méretének megfelelően.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha

Hús és egyéb ehető szövetek: 0 nap.
Tej: 0 nap.

Kanca

A termék nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt kancáknál és az emberi fogyasztásra szánt tejet termelő kancáknál.

► KISZERELÉS

6 x 13,4 g-os aeroszolos palackok és eldobható kesztyű dobozban.



Rifaximin, a 100%-ban a méhben ható antibiotikum

Hosszantartó
antibiotikus hatás

Tökéletes és egyenletes
eloszlás a méhben

0 napos várakozási idő
tejre és ehető szövetekre



Mastinaton

750 mg/5 g intramammális gél tejelő teheneknek
A.U.V.

► HATÓANYAG

Linkomicin 750 mg
(850 mg linkomicin-hidroklorid formájában)

► JAVALLAT

Staphylococcus aureus (beleértve a penicillináz termelő törzseket), koaguláz-negatív *staphylococcusok* (*Staphylococcus chromogenes* és *Staphylococcus epidermidis*), *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* és *Streptococcus uberis* linkomicinre érzékeny törzsei okozta klinikai masztitisz gyógykezelésére **tejelő teheneknek**.

► ADAGOLÁS

Intramammális alkalmazásra.

Adagolás: Egy előretöltött fecskendő/kezelendő tőgynegyed (megfelel 750 mg linkomicin/tőgynegyed).

A kezelést 12 óránként, háromszor meg kell ismételni.

Kezelés előtt a kezelendő, gyulladt tőgynegyedet alaposan ki kell fejni, és a tőgybimbókat (különösen a nyílását) a csomagolásban lévő, eldobható törölőkendővel meg kell tisztítani. A fecskendő kanüljének részleges bevezetéséhez

a kanül védőburkolatát el kell távolítani. A kanül teljes bevezetéséhez a részleges bevezetést lehetővé tevő adaptert is el kell távolítani. A kanült be kell vezetni a bimbócsatornába és a fecskendő teljes tartalmát be kell juttatni. Ezután ki kell húzni a kanült, egyik kézzel meg kell fogni a tőgybimbót, és a másik kéz hüvelyk- és mutatóujjával finoman felfelé kell nyomni a készítményt a bimbócsatornában. Ezután finoman masszírozni kell a tőgynegyedet mindkét kézzel, felfelé nyomva, hogy a készítmény egyenletesen eloszorjék a tejutakban.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap.
Tej: 84 óra (7 fejés).

► KISZERELÉS

20 db



Mastinaton

Intramammális gél tejelő teheneknek

750 mg
linkomicin

egyszerűen kivételes



Penethaone

236,3 mg/ml por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz, szarvasmarhák számára

► HATÓANYAG

1 ml felhasználásra kész szuszpenzió tartalmaz:
Penetamát-hidrojodid 236,3 mg (megfelel 182,5 mg penetamát-nak), ami 250 000 NE penetamát-hidrojodiddal egyenértékű
Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz

► JAVALLAT

Tejelő tehenek penicillinre érzékeny alábbi baktériumok okozta tőgygyulladásának gyógykezelésére: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae* ill. nem béta-laktamáz termelő *Staphylococcus aureus*.

► ADAGOLÁS

Mély intramuszkuláris alkalmazásra
Az alkalmazás módja: a szuszpenziót az oldószeres ampulla teljes tartalmának felhasználásával kell elkészíteni.
A pontos adagoláshoz a porampullák az alábbiak szerint hígítandók:
A 10 000 000 NE penetamát-hidrojodidot tartalmazó porampullát a 36 ml steril oldószerrel tartalmazó oldószeres ampullával kell feloldani.
Elkészítés után alaposan felrázandó.

Az ampullákat legalább 10-szer kell átforgatni. A szuszpenzió minden egyes ml-e 250 000 NE (236,3) penetamát-hidrojodidot tartalmaz.

Adagolás:

15 000 NE (14,2 mg) penetamát-hidrojodid/ttkg/nap (megfelel 6 ml feloldott készítménynek/100 ttkg) három vagy négy egymást követő napon át.
Alkalmazás előtt alaposan felrázandó.
A javasolt napi dózis 24-óránként, 3 vagy 4 egymást követő napon át alkalmazandó.
Az egy helyre befecskendezhető javasolt legnagyobb mennyiség 20 ml.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ


Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap.
Tej: 2,5 nap (60 óra).

► KISZERELÉS

100.000 NE-et tartalmazó porampulla és 36 ml-et tartalmazó oldószeres ampulla.



PENETHAONE®



**A MASTITIS
KEZELÉS
FORRADALMA**



Qivitan LC

75 mg intramammális kenőcs tejelő tehenek részére
A.U.V.

► HATÓANYAG

Cefquinom 75 mg
(88,92 mg cefquinom-szulfát formájában)

► JAVALLAT

Tejelő tehenek alábbi, cefquinomra érzékeny mikroorganizmusok által okozott klinikai tőgygyulladásának kezelésére: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Staphylococcus aureus* és *Escherichia coli*.

► ADAGOLÁS

Intramammális alkalmazásra.

Egy fecskendő tartalmát óvatosan a tőgy fertőzött negyedébe kell fecskendezni 12 óránként három, egymást követő fejés után.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek:

4 nap.

Tej: 5 nap (120 óra).

► KISZERELÉS

24 db

QIVITAN LC

Cefquinom 75 mg

VÁLASSZ BÖLCSEN

A LIVISTO MEGOLDÁSA A MASTITISRE



Utertab

2000 mg méhtabletta szarvasmarhák részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Tetraciklin-hidroklorid 2000,0 mg
(amely 1848,2 mg tetraciklinnek felel meg) tablettánként

► JAVALLAT

Tehenek ellés utáni megbetegedéseinek gyógykezelésére és megelőzésére az alábbi esetekben: tetraciklinre érzékeny kórokozók okozta endometriózis és magzatburok visszamaradás, valamint komoly ellési beavatkozások (fötotómia, császármetszés) esetén.

► ADAGOLÁS

Intrauterin alkalmazásra.

2 g tetraciklin-hidroklorid/tehen/nap amely megfelel 1 db tablettának/tehen/nap.

A kezelés 1-2 naponta ismételhető, a kezelések száma maximum 3 lehet.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: 10 nap.
Tej: 96 óra.

► KISZERELÉS

100 db



LIVISTO



UTERTAB

2000 mg méhtabletta


OTT HAT, AHOL KELL





SERTÉS VAKCINÁK

SERTÉS VAKCINÁK





Eryseng

szuszpenziós injekció sertéseknek

► HATÓANYAG

Inaktivált *Erysipelothrix rhusiopathiae*, R32E11 törzs

► JAVALLAT

Hím és nőivarú sertések aktív immunizálására *Erysipelothrix rhusiopathiae* 1-es és 2-es szerotípusa okozta sertésor-bánc klinikai tüneteinek (bőrelváltozások és láz) enyhítésére. Az immunitás kialakulása: három héttel az alapimmunizálási program befejezése után. Az immunitás időtartama: hat hónap.

► ADAGOLÁS

Beadás előtt a vakcinának szobahőmérsékletre (15-25 °C-ra) kell melegednie. Használat előtt alaposan felrázandó. Adjon be egy adagot (2 ml) intramuszkuláris injekcióként a nyaki izomzatba a következő ütemezés szerint:

Alapimmunizálás:

A termékkel még nem oltott, 6 hónapnál idősebb sertéseknek két injekciót kell beadni 3-4 hetes időközzel. A második injekciót a pároztatás előtt 3-4 héttel kell beadni.

Emlékeztető oltás:

Minden ezt követő pároztatás előtt 2-3 héttel egy injekciót kell beadni (körülbelül minden 6. hónapban).

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nulla nap.

► KISZERELÉS

50 adag

ERYSENG®

Egy **INNOVATÍV**
sertésorbánc elleni vakcina
a megbízható védelemért





Eryseng parvo

szuszpenziós injekció sertéseknek

► HATÓANYAG

Inaktivált sertés parvovírus, NADL-2 törzs
Inaktivált *Erysipelothrix rhusiopathiae*, R32E11

► JAVALLAT

Nőivarú sertések aktív immunizálására az utódok sertés parvovírus által okozott transzplacentáris fertőződése ellen.

Hím és nőivarú sertések aktív immunizálására *Erysipelothrix rhusiopathiae* 1-es és 2-es szerotípusa okozta sertésor-bánc klinikai tüneteinek (bőrelváltozások és láz) enyhítésére.

Az immunitás kialakulása:

Sertés parvovírus: a vemhességi időszak kezdetétől.

E. rhusiopathiae: három héttel az alapimmunizálási program befejezése után.

Az immunitástartósság:

Sertés parvovírus: az oltás magzati védelmet nyújt a vemhesség idejére. Emlékeztető oltást kell adni minden vemhesség előtt.

E. rhusiopathiae: az oltás az ajánlott emlékeztető oltás idejéig (az alapimmunizálás után kb. hat hónapig) védelmet nyújt a sertésor-bánc ellen.

► ADAGOLÁS

Intramuszkuláris alkalmazás.
Adjon be egy adagot (2 ml) intramuszkuláris injekcióként a nyaki izomzatba a következő ütemezés szerint:

Alapimmunizálás:

A termékkel még nem oltott, 6 hónapnál idősebb sertéseknek két injekciót kell beadni 3-4 hetes időközzel. A második injekciót a pároztatás előtt 3-4 héttel kell beadni.

Emlékeztető oltás:

Minden ezt követő pároztatás előtt 2-3 héttel egy injekciót kell beadni (körülbelül minden 6. hónapban).

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nulla nap.

► KISZERELÉS

10 adag, 50 adag

ERYSENG[®]

PARVO

HIPRAMUNE[®] G^{ad}
adjuvánssal



A védelem, amiben megbízhat

vakcina sertésor-bánc és sertések parvovírus okozta magzatkárosodása (SMEDI) ellen



Mhyosphere PCV ID

emulziós injekció sertéseknek

► HATÓANYAG

Inaktivált rekombináns *Mycoplasma hyopneumoniae*^{cpPCV2}, Nexhyon törzs: *Mycoplasma hyopneumoniae* és 2-es típusú sertés *circovirus* (PCV2) kapszid fehérje

► JAVALLAT

Sertések aktív immunizálására:

Sertés *Mycoplasma hyopneumoniae* által okozott enzootiás tüdőgyulladásával járó tüdőléziók csökkentésére. Ezen túlmenően ezen elváltozások előfordulásának csökkentésére. A virémia, a tüdő és a nyirokszövetek vírusterhelése, valamint a virémiás időszak hosszának csökkentésére a 2-es típusú sertés *circovirus* (PCV2) által okozott betegségek esetén. A PCV2-a, b és d genotípusaival szembeni hatékonyságot gyakorlati kipróbálások során bizonyították.

A *Mycoplasma hyopneumoniae*-vel és/vagy PCV2-vel kapcsolatos betegségek által okozott selejtezési és napi testtömeggyarapodás veszteség csökkentésére (amint azt 6 hónapos korú állatokon végzett gyakorlati kipróbálások során megfigyelték).

Mycoplasma hyopneumoniae:

Az immunitás kezdete: 3 hét a vakcinázás

után.

Az immunitástartósság: 23 hét a vakcinázás után.

2-es típusú sertés circovirus:

Az immunitás kezdete: 2 hét a vakcinázás után.

Az immunitástartósság: 22 hét a vakcinázás után.

Ezenkívül a PCV2, orrváladék és bélsár útján történő ürítésének, valamint az orrváladékkal történő ürítés időtartamának csökkenését igazolták a vakcinázást követő 4. és 22. héten a fertőzött állatokban.

► ADAGOLÁS

Intradermális alkalmazásra. Felhasználás előtt hagyni kell, hogy a vakcina felvegye a szobahőmérsékletet. Használat előtt alaposan felrázandó. Egy 0,2 ml-es adagot kell a sertéseknek 3 hetes kortól kezdve beadni, intradermálisan alkalmazva, a nyak oldalán, megfelelő tűmentes eszköz segítségével, amely alkalmas 0,2 ml-es adagok beadására (0,25–0,30 mm-es injektálási átmérővel és 0,9–1,3 N befecskendezési csúcserővel)

► **VÁRAKOZÁSI IDŐ:** Nulla nap.

► **KISZERELÉS:** 50 adag, 125 adag

TÖRTÉNELMET ÍRUNK...

MHYOSPHERE® PCV ID

Az első intradermális tű nélkül beadható vakcina
Mycoplasma hyopneumoniae és
PCV2 vírus ellen egyetlen antigénként



REKOMBINÁNS VAKCINA

A MHYOSPHERE® PCV ID az első olyan rekombináns vakcina, amelynél a *Mycoplasma hyopneumoniae* genomjába a PCV2 kapszidfehérjét kódoló génszakaszt építették be. A törzs neve NEXHYON.

SZÉLESKÖRŰ VÉDELEM

A PCV2-a, b és d TÍPUSÁVAL SZEMBEN is széleskörű védelmet biztosít.

TŰ NÉLKÜL

A legkönnyebb és legpontosabb - internet kapcsolatra épülő - tű nélküli eszköz, a Hipradermic® 3.0. biztosítja a vakcina tökéletes applikációját.



Rhiniseng

szuszpenzió injekcióhoz sertéseknek

► HATÓANYAG

Inaktivált *Bordetella bronchiseptica*,
833CER törzs

Pasteurella multocida rekombináns
D-típusú toxin (PMTr)

► JAVALLAT

Újszülött malacok anyatej útján kialakított passzív védelméhez a tenyészkocák és kocasüldők aktív immunizálásával a progrediáló és nem progrediáló atrophiás rhinitis klinikai jeleinek és lézióinak csökkentése érdekében, valamint a hizlalási időszakban fellépő *Bordetella bronchiseptica* és *Pasteurella multocida* fertőzéshez kapcsolható súlyvesztés csökkentése érdekében.

Ráfertőzőses vizsgálatokban a passzív immunitás malacokban 6 hetes korig volt kimutatható, míg gyakorlati körülmények között végzett vizsgálatokban az oltás védő hatása (orr lézió érték és súlyvesztés csökkenése) azok levágásáig megfigyelhető volt.

► ADAGOLÁS

Intramuszkuláris alkalmazás.
Beadás előtt a vakcinának szobahőmérsékletre (15-25°C) kell melegednie. Használat előtt alaposan felrázandó. Adjon be egy adagot (2 ml) mély intramuszkuláris injekcióként a nyaki izomzatba.

Alapimmunizálás: a termékkel még nem oltott kocák és kocasüldők két injekciót kapnak 3-4 hetes időközzel. Az első injekciót az ellés várható időpontja előtt 6-8 héttel kell beadni.

Emlékeztető oltás: minden ezt követő vemhességnél egy injekció adandó 3-4 héttel az ellés várható időpontja előtt.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nulla nap.

► KISZERELÉS

50 adag



RHINISENG®

HIPRAMUNE®^d adjuvánssal

Egyetlen vakcina a sertések progrediáló és nem progrediáló torzító orrgyulladásának megelőzésére



és a telep könnyebben lélegzik...



Suiseng Coli/C

vakcina A.U.V. szuszpenziós injekció sertések részére

► HATÓANYAG

Összetétel adagonként (2 ml):

E. coli F4ab fimbriális adhezin

E. coli F4ac fimbriális adhezin

E. coli F5 fimbriális adhezin

E. coli F6 fimbriális adhezin

E. coli LT enterotoxoid

C típusú *Clostridium perfringens* β toxoid

B típusú *Clostridium novyi* α toxoid

► JAVALLAT

Malacok: Újszülött malacok passzív védelmére **tenyészkocák és kocasüldők** aktív immunizálásával; az F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) vagy F6 (987P) adhezineket expresszáló enterotoxikus *Escherichia coli* által okozott mortalitás és a neonatális enterotoxikózis klinikai tüneteinek csökkentésére.

Újszülött malacok passzív védelmére nekrotikus bélgyulladás ellen, **tenyészkocák és kocasüldők** aktív immunizálásával, mely a C típusú *Clostridium perfringens* β -toxinja ellen szeroneutralizáló ellenanyagok indukálására szolgál.

Kocák és kocasüldők:

A tenyészkocák és kocasüldők aktív immunizálására, a B típusú *Clostridium novyi* α toxinja elleni szeroneutralizáló ellenanyagok indukálására.

► ADAGOLÁS

Intramuszkulárisan, a nyaki izmokba. Sertés: 2 ml/állat.

Az **alapimmunizálás** két adagból áll: az első adag körülbelül 6 héttel az ellés előtt, a második adag pedig körülbelül 3 héttel az ellés előtt.

Javasolt a második adag ellentétes oldalba történő beadása.

Emlékeztető oltás:

Minden ezt követő vemhességnél adjon be egy adagot 3 héttel az ellés várható ideje előtt.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nulla nap.

► KISZERELÉS

10 adag, 50 adag



SUISENG[®]

vakcina

HIPRAMUNE[®]  vivőanyaggal

Védelem - új alapokon

Egyedülálló **kombinált vakcina** a malacok újszülöttkori hasmenésének és a szoptató kocák hirtelen elhullásának teljes védelmére



Suiseng Diff/A

szuszpenziós injekció sertéseknek

► HATÓANYAG

Összetétel adagonként (2 ml):
Clostridioides difficile, toxoid A (TcdA)
Clostridioides difficile, toxoid B (TcdB)
Clostridium perfringens A típusú,
alfa-toxoid
alumínium-hidroxid gél, ginzeng kivonat,
DEAE-dextrán.

► JAVALLAT

Újszülött malacok passzív immunizálására tenyészkocák és kocasüldők aktív immunizálásával, a mortalitás megelőzésére, valamint a *C. difficile*, A és B toxinok által okozott klinikai tünetek és makroszkopikus elváltozások csökkentésére, valamint *C. perfringens* A típusú, a-toxin okozta klinikai tünetek és a makroszkopikus elváltozások csökkentésére.

Az immunitás időtartama:

A kolosztrumon keresztül a malacokba átvitt neutralizáló, protektív ellenanyagok a születés után 28 napig jelen voltak a legtöbb malacban.

► ADAGOLÁS

Intramuszkulárisan, a nyaki izmokba.
Sertés: 2 ml/állat.

Az alapimmunizálás két adagból áll:
az első adag körülbelül 6 héttel az ellés előtt, a második adag pedig körülbelül 3 héttel az ellés előtt.

Javasolt a második adag ellentétes oldalba történő beadása.

Emlékeztető oltás:

Minden ezt követő vemhességnél adjon be egy adagot 3 héttel az ellés várható ideje előtt.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

0 nap.

► KISZERELÉS

25 adag



MÉG
TÖBB
KONTROLL

SUISENG
Diff/A

Az **első és egyetlen** *C.difficile* és *C.perfringens* A tip. elleni vakcina, amely hozzájárul a **visszatérő újszülöttkori hasmenés** elleni vakcinázási terv tökéletesítéséhez.



SPC **Vepured**
szuszpenziós injekció sertéseknek



► **HATÓANYAG**

E. coli rekombináns 2e verotoxin

Egyszer 1 ml-es intramuszkuláris injekciót kell beadni a nyaki izmokba 2 napos kortól.

► **JAVALLAT**

A **malacok** aktív immunizálása 2 napos koruktól, amely csökkenti az elhullás mértékét és mérsékli az (*E. Coli* baktériumok által termelt verotoxin 2e okozta) ödémás betegségek klinikai jeleit és csökkenti a napi súlyvesztés mértékét az (*E. Coli* baktériumok által termelt verotoxin 2e okozta) fertőzések befejező időszakában a 164 napos kor utáni vágásérett korig.

Az immunitás kialakulása:

21 nappal a vakcinázás után.

Az immunitástartósság:

112 nap a vakcinázást követően.

► **ADAGOLÁS**

Intramuszkuláris alkalmazás.

Beadás előtt a vakcinának szobahőmérsékletre (15-25 °C) kell melegednie.

Használat előtt alaposan felrázandó.

► **VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Nulla nap.

► **KISZERELÉS**

50 adag, 100 adag

VEPURED®

Purified

Tisztított, rekombináns 2e verotoxint tartalmazó szuszpenziós injekcióval az ödéma betegség ellen

ÖDÉMA BETEGSÉG

TISZTÍTOTT VAKCINA

NYERNI VAGY VESZÍTENI EZ ITT A KÉRDÉS



SZARVASMARHA ÉS JUH

VAKCINÁK



Divence IBR marker live

liofilizátum és oldószer emulziós injekcióhoz

► HATÓANYAG

Élő, gE- tk-dupla deléciós 1-es típusú szarvasmarha herpeszvírus (BHV-1) CEDDEL törzs.

Liofilizátum és oldószer.

► JAVALLAT

10 hetesnél idősebb szarvasmarhák 1-es típusú szarvasmarha herpeszvírus (BHV-1) elleni aktív immunizálására, a szarvasmarhák fertőző orr- és légcsőgyulladása (IBR) klinikai tüneteinek, a hipertermia illetve a vírusürítés mértékének csökkentése érdekében.

Az immunitás kialakulása: 3 héttel az alapimmunizálás befejezése után.

Az immunitástartósság: az alapimmunizálás befejezését követő 6 hónap, az emlékeztető oltás után 1 év.

► ADAGOLÁS

10 hetes kortól 2 ml dózisban intramusz- kulárisan, 3 hét múlva ismétелendő.

Emlékeztető oltás az alapimmunizálás után 6 hónappal. További emlékeztető oltások legfeljebb 12 hónap múlva.

A szuszpenziós injekció elkészítéséhez oldja fel a liofilizátumot a mellékelt

oldószer teljes mennyiségében.

A liofilizátum feloldása előtt biztosítani kell, hogy az oldószer 10-20 C hőmérsék- letű legyen.

Az előírás szerinti feloldás után felhasz- nálhatóság: 2 óra.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

0 nap.

► KISZERELÉS

5 adagos, 20 adagos

DIVENCE®

IBR MARKER LIVE

Az **EXTRA** az, ami az átlagost
RENDKÍVÜLIVÉ teszi

Make it simple!



SPC Divence PENTA

líoofilizátum és oldószer emulziós injekcióhoz

► HATÓANYAG

Élő attenuált szarvasmarha járványos köhögése vírus (*bovin respiratory syncytial* vírus BRSV) LYM-56 törzs, inaktivált szarvasmarha parainfluenza 3 vírus (PI-3), SF4 törzs, rekombináns E2 fehérje a szarvasmarha vírusos hasmenése 1-es típusú vírusából (BVDV-1), rekombináns E2 fehérje a szarvasmarha vírusos hasmenése 2-es típusú vírusából (BVDV-2), élő gE- tk-dupla deléciós 1-es típusú szarvasmarha herpesvírus (BHV-1) CEDDEL törzs.

Líoofilizátum és oldószer.

► JAVALLAT

Szarvasmarhák aktív immunizálására 10 hetes kortól:

BRSV és PI-3: a vírusürítés, a hipertermia, a klinikai tünetek és a tüdőelváltozások csökkentésére **BoHV-1:** a vírusürítés, a hipertermia, az IBR (fertőző szarvasmarha rhinotracheitis) klinikai tüneteinek csökkentésére **BVDV:** a BVDV-1 és BVDV-2 által okozott virémia, hipertermia és leukopénia és a BVDV-2 által okozott vírusürítés csökkentésére.

Üszők és tehenek aktív immunizálására, a perzisztensen fertőzött borjak születésének és a BVD (1-es és 2-es típus)

vírusával való transzplacentális fertőzés csökkentésére.

Az immunitás kialakulása: 3 héttel az alapimmunizálás befejezése után. A transzplacentáris (1-es és 2-es típusú) BVDV-fertőzéssel szembeni védelem 3 héttel az emlékeztető oltás után alakul ki. Az immunitástartósság: az alapimmunizálás befejezését követő 6 hónap, az emlékeztető oltás után 1 év.

► ADAGOLÁS

10 hetes kortól 2 ml dózisban intramuszkulárisan, 3 hét múlva ismételendő. Emlékeztető oltás az alapimmunizálás után 6 hónappal. További emlékeztető oltások legfeljebb 12 hónap múlva.

A szuszpenziós injekció elkészítéséhez oldja fel a líoofilizátumot a mellékelt oldószer teljes mennyiségében.

A líoofilizátum feloldása előtt biztosítani kell, hogy az oldószer 10-20 C hőmérsékletű legyen.

Az előírás szerinti feloldás után felhasználhatóság: 2 óra.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ 0 nap

► KISZERELÉS

5 adagos, 20 adagos



DIVENCE®

PENTA

Az **EXTRA** az, ami az átlagost **RENDKÍVÜLIVÉ** teszi

Make it simple!





Divence TETRA

liofilizátum és oldószer emulziós injekcióhoz

► HATÓANYAG

Élő attenuált szarvasmarha járványos köhögése vírus (*bovin respiratory syncytial* vírus BRSV) LYM-56 törzs, inaktivált szarvasmarha parainfluenza 3 vírus (PI-3), SF4 törzs, rekombináns E2 fehérje a szarvasmarha vírusos hasmenése 1-es típusú vírusából (BVDV-1), rekombináns E2 fehérje a szarvasmarha vírusos hasmenése 2-es típusú vírusából (BVDV-2). Liofilizátum és oldószer.

► JAVALLAT

Szarvasmarhák aktív immunizálására **10 hetes kortól:**

BRSV és PI-3: a vírusűrités, a hipertermia, a klinikai tünetek és a tüdőelváltozások csökkentésére.

BVDV: a BVDV-1 és BVDV-2 által okozott virémia, hipertermia és leukopénia és a BVDV-2 által okozott vírusűrités csökkentésére.

Üszők és tehenek aktív immunizálására, a perzisztensen fertőzött borjak születésének és a BVD (1-es és 2-es típus) vírusával való transzplacentális fertőzés csökkentésére.

Az immunitás kialakulása: 3 héttel az alapimmunizálás befejezése után.

A transzplacentáris (1-es és 2-es típusú) BVDV-fertőzéssel szembeni védelem 3 héttel az emlékeztető oltás után alakul ki. Az immunitástartósság: az alapimmunizálás befejezését követő 6 hónap, az emlékeztető oltás után 1 év.

► ADAGOLÁS

10 hetes kortól 2 ml dózisban intramuszkulárisan, 3 hét múlva ismétlendő. Emlékeztető oltás az alapimmunizálás után 6 hónappal. További emlékeztető oltások legfeljebb 12 hónap múlva.

A szuszpenziós injekció elkészítéséhez oldja fel a liofilizátumot a mellékelt oldószer teljes mennyiségében.

A liofilizátum feloldása előtt biztosítani kell, hogy az oldószer 10-20 C hőmérsékletű legyen.

Az előírás szerinti feloldás után felhasználhatóság: 2 óra.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

0 nap

► KISZERELÉS

5 adagos, 20 adagos



DIVENCE® TETRA

Az **EXTRA** az, ami az átlagost
RENDKÍVÜLIVÉ teszi

Make it simple!





Hiprabovis Somni/Lkt

vakcina A.U.V. emulziós injekció szarvasmarhák részére

► HATÓANYAG

Mannheimia haemolytica A biotípus A1 szerotípus leukotoxoid tartalmú inaktivált sejtmentes szuszpenzió
Inaktivált *Histophilus somni* Bailie törzs

► JAVALLAT

A *Mannheimia haemolytica* A1 és a *Histophilus somni* által okozta klinikai tünetek és tüdőelváltozások enyhítésére 2 hónapos kornál idősebb **borjakban**.

► ADAGOLÁS

Szarvasmarha:

2 ml/állat, 2 hónapos kortól.

Borjanként egy adag, 2 ml vakcina beadása ajánlott 2 hónapos korban.
A 2 ml-es adag beadását 21 nap elteltével meg kell ismételni.

Alkalmazása szubkután történik. A borjakat szubkután injekcióval a nyaki részen kell oltani.

A második adag befecskendezése az előzővel ellentétes oldalon javasolt.

Az immunitás kezdete:

Az oltási program elvégezte után 3 héttel.

Használat előtt felrázandó.

A beadás előtt a vakcinát ajánlott 15-20 °C hőmérsékletre felmelegíteni.

A vakcina használata stresszhelyzetek (szállítás, eladás...) előtt ajánlott.

Az oltási programot ezen időszakok előtt kell végezni.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nulla nap.

► KISZERELÉS

10 adag



HIPRABOVIS® SOMNI/Lkt

Inaktivált *Histophilus somni* és *Mannheimia haemolytica* leukotoxoid (Lkt) tartalmú emulziós injekció szarvasmarhák részére

ELJÖTT A PREVENCIÓ NAPJA



Az első és egyetlen vakcina az EU-ban *Histophilus somni* és *Mannheimia haemolytica* (Lkt) ellen.

► HATÓANYAG

Inaktivált *Chlamydia abortus* A22 törzs
Inaktivált *Salmonella enterica* subsp. *enterica* Abortusovis szerotípus, Sao törzs

► JAVALLAT

Juhok aktív immunizálására a *Chlamydia abortus* okozta klinikai tünetek (vetélés, halva születés, korai elhullás és hipertermia), a *Salmonella abortusovis* okozta vetélés, illetve mindkét patogén esetében a fertőzött állatok általi ürítés csökkentésére.

A vakcinázás a teljes vemhességi időszakot lefedi, ha az ajánlott vakcinázási ütemterv szerint adják be.

► ADAGOLÁS

Jerkéknél alkalmazandó 5 hónapos kortól kezdődően.

Adagolás:

2 ml szubkután injekció a lapocka mögött a bordáknál (oldalsó mellkasi régió).

Alapvakcinázás

Az állatok 2 adag vakcinát kapjanak 3 hetes időközzel. Az első adagot legalább

5 héttel a mesterséges termékenyítés vagy fedeztetés előtt kell beadni, a másodikat pedig az első adag után 3 héttel.

Ismétlő vakcinázás

Egyszeri emlékeztető oltást (2 ml) kell beadni 2 héttel minden egyes mesterséges termékenyítés vagy pároztatás előtt, de legkésőbb 1 évvel az első alapvakcinázás után.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nulla nap.

► KISZERELÉS

25 adag

INMEVA



Chlamydia abortus



Salmonella Abortusovis

INAKTIVÁLT
VAKCINAKETTŐS
VÉDETTSÉG

lioofilizátum és oldószer szuszpenziós injekcióhoz vagy orrsprayhez szarvasmarháknek

► HATÓANYAG

Élő attenuált szarvasmarha járványos köhögése vírus (*bovin respiratory syncytial virus* BRSV) LYM-56 törzs
Liofilizátum és oldószer

► JAVALLAT

Szarvasmarha aktív immunizálása a vírusürítés és a szarvasmarha járványos köhögése (RSV) vírusfertőzés okozta klinikai tünetek csökkentésére.

Az immunitás kezdete:

21 nappal egy adag nazális úton történő beadását követően.

21 nappal a kétadagos intramuszkuláris oltási séma második adagját követően.

Az immunitástartósság:

2 hónap nazális vakcinázás után.

6 hónap intramuszkuláris vakcinázás után.

► ADAGOLÁS

Nazális vagy intramuszkuláris alkalmazás.

A vakcina feloldásához a megfelelő mennyiségű oldószer használandó: 5 adaghoz - 10 ml.

Rázza az injekciós üveget amíg a fagyasztva szárított por teljesen el nem szuszpendálódik. 25 adagos injekciós üveg esetén a fagyasztva szárított por 10 ml oldószerrel való szuszpenziója után az injekciós üvegből szívja fel a teljes mennyiséget és fecskendezze a maradék oldószerrel tartalmazó injekciós üvegbe. Használat előtt alaposan felrázandó.

A feloldott vakcina enyhén sárgás színű

homogén szuszpenzió.

Nazális alkalmazás esetén nazális applikátorral permetezze a szükséges mennyiségű vakcinát az állat orrlyukaiba (mindkét orrlyukba 1 ml) (cseppméret: 25–220 µm). Ajánlatos minden állatnál új applikátort alkalmazni.

A következő adagok és adagolási módok alkalmazandók:

Borjak, 9 napos kortól:

Alapimmunizálás (nazális alkalmazás): Permetezzen 1 ml-t mindkét orrlyukba (a teljes beadott dózis tehát 2 ml).

Újraoltás: Egy intramuszkuláris injekcióban 2 ml-t kell beadni 2 hónappal az első vakcinázás után, majd ezt az utolsó újraoltástól számított 6 hónaponként ismételni.

Borjak, 10 hetes kortól:

Alapimmunizálás (intramuszkuláris injekció): Egy intramuszkuláris injekcióban 2 ml-t kell beadni, majd egy második 2 ml-es intramuszkuláris injekciót 4 héttel később.

Újraoltás: Egy intramuszkuláris injekcióban 2 ml-t kell beadni 6 hónappal az alapimmunizálás befejezését követően, majd ezt az utolsó újraoltástól számított 6 hónaponként ismételni.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nulla nap.


► KISZERELÉS

5 adag



NASYM®

Az egyetlen IN & IM BRSV vakcina



- Vakcinázás a lehető legkorábbi időpontban
- Intranasalis alapimmunizálás és intramuszkuláris booster a **hosszan tartó immunitásért**
- A Nasym csökkenti a légzőszervi **klinikai tüneteket is** és a **vírusürítést is**
- **Flexibilitás** az applikációban és a vakcinázási protokollban

► HATÓANYAG

Inaktivált *Escherichia coli* J5 törzs, nyákhoz kötött antigénkomplexet expresszá-ló (slime associated antigenic complex = SAAC), *Staphylococcus aureus* (CP8) SP 140 törzs

► JAVALLAT

Egészséges **tehén- és üszőállomá-nyok**, visszatérő tőgygyulladásos teje-lő tehénállományok immunizálására, a szubklinikai tőgygyulladás előfordulásá-nak, és a *Staphylococcus aureus*, *co-liform* baktériumok és koaguláz-negatív *Staphylococcusok* által okozott tőgy-gyulladás gyakoriságának és súlyosságá-nak csökkentésére.

A teljes immunizálási program, az első ol-tás utáni körülbelül a 13. naptól a harma-dik oltás utáni körülbelül a 78. napig bizto-sít immunitást.

► ADAGOLÁS

Intramuszkuláris alkalmazás.

Az injekciókat lehetőleg a nyak egyik majd másik oldalába kell beadni felváltva.

Beadás előtt hagyja a vakcinát:

+15 - +25 °C-ra felmelegedni.

Használat előtt összerázandó.

Adjon be egy adagot (2 ml) mély intra-muszkuláris injekcióval a nyakizmokba 45 nappal az ellés feltételezett időpontja előtt, majd 1 hónappal később adja be a második adagot (legkevesebb 10 nappal a borjazás előtt). A harmadik adagot to-vábbi 2 hónap múlva ajánlott beadni.

Minden vemhesség alkalmával meg kell ismételni a teljes immunizálási programot.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nulla nap.

► KISZERELÉS

1x 25 adag, 20x 1 adag

Inaktivált vakcina *Escherichia coli*,
Staphylococcus aureus és
koaguláz-negatív *staphylococcusok*
(CNS baktériumok) ellen



Biztos eredmény: kevesebb mastitis



SPC **UBAC**
emulziós injekció szarvasmarháknek

► **HATÓANYAG**

Streptococcus uberis, 5616-os törzs biofilm adhéziós komponenséből (BAC) származó lipoteicholsav (LTA)

► **JAVALLAT**

Egészséges tehenek és **üszők** aktív immunizálására a *Streptococcus uberis* okozta klinikai tőgyfertőzések előfordulásának és a *Streptococcus uberis* pozitív tőgynegyed-tejminták szomatikus sejtszámának csökkentéséhez, valamint a *Streptococcus uberis* tőgyfertőzések okozta tejtermelési veszteség mérsékléséhez.

Az immunitás kialakulása: körülbelül 36 nappal a második dózis beadása után.

Az immunitástartósság: körülbelül a laktáció első 5 hónapja.

► **ADAGOLÁS**

Intramuszkuláris alkalmazás. Az injekciókat lehetőleg a nyak egyik, majd másik oldalába felváltva kell beadni. Beadás előtt hagyja a vakcinát +15 - +25 °C-ra felmelegedni. Használat előtt felrázandó.

Adjon be egy adagot (2 ml) mély intramuszkuláris injekcióként a nyaki izomba a következő oltási séma szerint:

- Első oltást a várt ellési idő előtt 60 nappal.
- Második oltást a várt ellési idő előtt 21 nappal.
- A harmadik oltást mintegy 15 nappal az ellés után kell beadni.

Azoknál az állatoknál, amelyeket nem eszerint a program szerint kezeltek, a védettség nem bizonyított. Ezt a tényt figyelembe kell venni az állomány immunizálása esetén. A teljes immunizálási programot minden vemhesség esetén meg kell ismételni.

► **VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Nulla nap.

► **KISZERELÉS**

25 adag



UBAC®

Alegység vakcina a *Strep. uberis* okozta klinikai mastitis ellen

In Mastitis control

PRE
is the new
PRO

—

VEDD ÁT
AZ IRÁNYÍTÁST
A STREP. UBERIS
FELETT

—



The Reference
in Prevention
for Animal Health



BAROMFI VAKCINÁK





PRIMUN SALMONELLA E

vakcina A.U.V. liofilizátum házityúkok számára ivóvízben történő használatra

► HATÓANYAG

Élő, attenuált *Salmonella enterica* alfaj *enterica* variáns baktériumtörzs ST CAL 10 STR⁺/Rif⁺/Ssq- 1-6 10⁸ TFU.
Segédanyagok: sovány tejpor, cukor, zselatin, HEPES pufferoldat, injekcióhoz való víz.

► JAVALLAT

Házityúkok (későbbi tojótyúkok és tenyészttyúkok) aktív immunizálása a belső szervek (lép, máj, végbél és petefészek) *Salmonella* Enteritidis vad törzsek kolonizálásának és a széklettel történő ürülésének csökkentésére.

► ADAGOLÁS

Ivóvízben feloldva. Liofilizátum ivóvízben történő alkalmazásra.

Az alapimmunizálás három itatásból áll:

1. vakcinázás az 1 életnapon (ez élet első 72 órájában).
2. vakcinázás a 6-8 élethéten.
3. vakcinázás a 14-18 élethéten, de 3 héttel a tojásrakás kezdete előtt.

Az immunitás kezdete az első vakcinázás után 14 nappal, a második és a harmadik

vakcinázás után 4 héten belül.

Az immuntartósság a 80 héttel a harmadik oltás után, 40 héttel a negyedik vakcinázás után, ha a vakcinázási ütemtervnek megfelelően alkalmazták.

Nem alkalmazható a tojásrakás előtt 3 héttel, alkalmazható a tojásrakás idején.

A Primun Salmonella E+T kombinált formulájával történő vizsgálatok során nem mutattak ki negatív kölcsönhatást.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek:
21 nap az első és a második és a harmadik vakcinázás után,
14 nap a negyedik vakcinázás után.
Tojás: 4 vakcinázás után nulla nap.

► KISZERELÉS

2000 adag
4000 adag

Primun Salmonella E

ÜDVÖZLET A VAKCINÁZÁS VILÁGÁBAN!

FENN TART HATÓ





PRIMUN SALMONELLA T

vakcina A.U.V. liofilizátum házityúkok számára ivóvízben történő használatra

► HATÓANYAG

Élő, attenuált *Salmonella enterica* subs. *enterica* var. *Typhimurium* baktériumtörzs ST CAL 16 STR⁺/Rif⁺/Enr- 1-6 10⁸ TFU.
Segédanyagok: sovány tejpor, cukor, zselatin, HEPES pufferoldat, injekcióhoz való víz.

► JAVALLAT

Házityúkok (broiler, későbbi tojótyúkok és tenyészttyúkok) aktív immunizálása *Salmonella Typhimurium* vad törzsekkel a széklettel történő kiválasztás és a belső szervek kolonizálásának csökkentése érdekében.

► ADAGOLÁS

Ivóvízben feloldva. Liofilizátum ivóvízben történő alkalmazásra.

Az alapimmunizálás három itatásból áll:

1. vakcinázás az 1. életnapon (ez az élet első 72 órájában).
2. vakcinázás a 6-8. élethétén.
3. vakcinázás a 14-18. élethétén, de 4 héttel a tojásrakás kezdete előtt.

Az immunitás kezdete az első vakcinázás

után 14 nappal. Az immuntartósság a 61. héttel a harmadik oltás után, ha a vakcinázási ütemtervnek megfelelően alkalmazzák.

Nem alkalmazható a tojásrakás előtt 4 héttel és nem alkalmazható a tojásrakás idején.

A Primun Salmonella E+T kombinált formulájával történő vizsgálatok során nem mutattak ki negatív kölcsönhatást.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek:
28 nap az első és a második vakcinázás után,
14 nap a harmadik vakcinázás után.

► KISZERELÉS

2000 adag
4000 adag

Primun Salmonella T

ÜDVÖZLET A VAKCINÁZÁS VILÁGÁBAN!

FENN TART HATÓ





FERTŐTLENÍTŐ ÉS ROVARÖLŐ KÉSZÍTMÉNYEK



Aquazix E52

víz tisztító-fertőtlenítőszer valamennyi állatfaj részére

► HATÓANYAG

50% hidrogén-peroxid, ad 100% ví-vőanyag, a termék stabilizátort tartalmaz

► JAVALLAT

Az állatok ivóvizének, valamint állattartó telepeken a víztartályok, csővezetékek, itatók fertőtlenítésére szolgáló biocid termék.

Besorolása: 1. főcsoport 5. terméktípus (ivóvíz-fertőtlenítő szer). Baktericid, fungicid.

► ADAGOLÁS

Az állatok ivóvizének fertőtlenítése (az állatok jelenlétében): 10-30 ml Aquazix E52/1.000 liter ivóvíz. A fertőtlenítőszerből az ivóvízbe maximálisan adagolható mennyiség 0,5 mol hidrogén-peroxid/liter víz, azaz a koncentráció legfeljebb 17 mg hidrogén-peroxid/liter víz lehet.

A hidrogén-peroxid ivóvízben lévő maradék-koncentrációját megfelelő teszt-módszerekkel rendszeresen ellenőrizni szükséges. Az ivásra szánt vízben a maximális maradék koncentráció 0,1 mg hidrogén-peroxid/liter ivóvíz lehet.

A fertőtlenítés hatékonysága a végponton ellenőrizendő.

A vízvezeték-rendszer tisztítása (az állatokat távol tartva): 1%-os oldat (1 liter Aquazix E52/100 liter víz).

A hatásidő: 3 óra. A hatásidő letelte után a rendszer alaposan átöblítendő.

A termék megfelelő mennyiségét közvetlenül vagy pumpával adagolva juttassuk a víztartályokba vagy a csővezetékekbe.

A kezelt csővezetékek, itatók csak a rendszer teljes átöblítése és a hidrogén-peroxid maradék koncentrációjának ellenőrzése után vehetők újból használatba. A vízvezeték-rendszer tisztítása az állatok jelenlétében nem végezhető.

A terméket más vegyszerrel keverni tilos! Kerüljük el, hogy inkompatibilis fémekkel, oxidáló- és redukáló szerekkel, savakkal, lúgokkal, alkoholokkal és halogénekkal érintkezzen.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

► KISZERELÉS

20 liter



Biocidok Biológiai Hatása ZIX

Tiszta ivóvíz, egészséges bélrendszer

Kulcs a hasmenések megelőzéséhez

Aquazix®

Az állatok ivóvizének és a kapcsolódó vízvezeték-rendszer tisztítására és fertőtlenítésére

Aquazix® – hidrogén-peroxid – Aquazix® E 52
Enterozix® nucleus – ezüst kolloid

1. Javítja az ivóvíz mikrobiológiai minőségét
2. Oldja a biofilmet és a vízkőt
3. Az emésztőrendszeri problémákat megelőzi
4. A termelési paramétereket növeli

**alomfertőtlenítő- és szárító állatgyógyászati ápolószer
valamennyi állatfaj estében**

► **HATÓANYAG**

kalcium-karbonát 85%
mikronizált fűrészpor 14%
eukaliptusz olaj 0,5%
szintetikus kámfor 0,5%

► **JAVALLAT**

A Litazix por összetételénél fogva biztosítja az állatok, különösen az újszülött és fiatal állatok számára nélkülözhetetlen száraz környezetet, ezáltal biztosítva az állat komfortérzetét. Az állat testfelületére tapadva felitatja a testnedveket, magzatvizet, izzadságot, vizeletet, hasmenéses bélsár nyomokat, ezáltal javítva az állat hőérzetét. Elősegíti a köldökcsonk beszáradását, a bőr és a szőrzet tisztán tartását. Az istállóban alkalmazva megköti a nedvességet és a szárazabb alom az istálló levegőjét is tisztábban tartja.

► **ADAGOLÁS**

Az istálló páratartalmától és az állatok korától, fajtától függően az alábbi mennyiségeket szórjuk az állatok tartózkodási helyére, a malacok tartózkodási helyére, a tojófészkekbe és az alomra:

Sertés (koca a malacaival):

50 g/nap közvetlenül az állatra szórva

Brojler, tenyész- és tojótyúk, pulyka:

40 g/m² hetente 2x

Kacsa, liba (szalma alom, mélyalom):

50 g/m² naponta

Kacsa, liba (rácspadozat):

30 g/m² naponta

Tejelő tehén (istálló):

300 g/tehén hetente 3x

Tejelő tehén (kötött tartás):

130 g/tehén/nap

Borjú (istálló):

80 g/m² hetente 3x

Borjú (Steimmann ketrec):

60 g/szopós borjú/nap

Juh, kecske, ló:

50 g/juh, kecske, ló hetente 3x

Bárány, gida:

50 g/bárány/gida nap

Nyúl:

1 evőkanál/fészek

Ló (box):

200 g/ló hetente 3x

► **VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Nem értelmezhető.

► **KISZERELÉS**

25 kg

Litazix®

Baktericid, virucid és fungicid hatás



LITAZIX por - állatgyógyászati ápolószer



Biocidas Biodegradables ZIX

Virox

fertőtlenítő por



► HATÓANYAG

Pentakálium-monoperszulfát, (KPMS, hármassó)

► JAVALLAT

Baktericid, virocid, fungicid fertőtlenítőszer vízben oldódó por formájában, stabilizált peroxid hatóanyaggal.

Állategészségügyi felhasználásra, felületek és légtér fertőtlenítésére az állattartás területén.

Csak képzett személyzet használhatja.

Telepeken vagy állattenyésztési vállalkozásban **valamennyi állatfajnál** történő felhasználásra: sertések, tojó- és tenyész tyúkok, brojlercsirkék, kacsák, pulykák, fogoly, juhok, borjak, tejelő tehenek.

Inkubátorokban és keltetőkben történő felhasználásra.

Anyagok és eszközök fertőtlenítéséhez. Megtisztítja és eltávolítja a biofilmet a felületekről. Tartályokat és a gabonátárolók fertőtlenítéséhez. Állatszállító járművek fertőtlenítéséhez. Fertőtlenítő medencéhez, kerékmosásra alkalmas. Párásítók, hűtők és párologtatók fertőtlenítésére a gazdaságokban.

► ADAGOLÁS

Általános fertőtlenítés céljából (0,5% oldat) egy liter vízhez oldjunk fel 5 gramm terméket. Súlyos szennyeződés esetén ez 1%-os koncentrációra, 10 gramm/liter vízben emelhető. Ajánlott adagolás: 200-300 ml oldat/m²

felület. A légtér fertőtlenítés alkalmával minden m³-re 1 liter oldatot kell alkalmazni. Behatási idő: 5-15 perc.

A munkaidőt felhasználás előtt frissen kell elkészíteni.

Általános fertőtlenítés: A munkaidőt permetezzük a fertőtlenítendő felületre (200-300 ml munkaidő/m²) úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak vagy áztassuk/merítsük be a fertőtlenítendő tárgyat a munkaidőbe úgy, hogy azt teljesen ellepje. A megfelelő behatási idő letelte után hagyjuk a felületet/tárgyat megszáradni, vagy szükség esetén vízzel öblítsük le.

Légtérkezelés hideg és meleg ködképzéssel, alkalmazási paraméterek: 1 liter munkaidő/m³ A létesítmények légtérkezelését végző személyeknek képzettnek kell lennie. A fertőtlenítést az állatok és az emberek távollétében kell elvégezni. Alkalmazása után a terméket a bejáratok lezárásával 3 órán keresztül hagyjuk hatni. Az épületek, az állatok beengedése, vagy ember belépése előtt alaposan ki kell szellőztetni.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

► KISZERELÉS

5 kg

A HAGYOMÁNYOS KÉMIAI FERTŐTLENÍTŐSZEREK ALTERNATÍVÁJA

Virox®

EFICACIA PROBADA POR NORMAS UNE OFICIALES EUROPEAS

Baktericid, virucid, fungicid fertőtlenítőszer
vízben oldódó por formában
100%-ban biológiailag lebomló hatóanyag

Bizonyított hatékonyság
Stabilizált peroxid hatóanyaggal

Széles hatásspektrum,
gyors hatás alacsony hőmérsékleten,
kemény vízben, szerves anyag jelenlétében is



Biocidas Biodegradables ZIX



PARAZITAEELLENES KÉSZÍTMÉNYEK



Cryptisel

0,5 mg/ml belsőleges oldat borjak számára A.U.V.

► HATÓANYAG

Halofuginon 0,5 mg/ml

► JAVALLAT

Szarvasmarha (újszülött borjú).

Cryptosporidium parvum okozta hasmenés megelőzésére azokon a telepeken, ahol a cryptosporidiózis jelen van. A kezelést az élet első 24-48 órájában el kell kezdeni.

Cryptosporidium parvum okozta hasmenés enyhítésére. A kezelést a hasmenés kezdete után 24 órán belül el kell kezdeni. Az oocysták ürítése mindkét esetben bizonyítottan csökken.

► ADAGOLÁS

Szájon át alkalmazandó borjaknak etetés után.

Adagolás: 100 µg halofuginon/ttkg naponta egyszer, 7 egymást követő napon keresztül, azaz 2 ml állatgyógyászati készítmény/10 ttkg naponta egyszer, 7 egymást követő napon keresztül.

A folyamatos kezelést minden nap azonos időpontban végezzük. Az első újszülött borjú kezelése után valamennyi öt követő újszülött borjat kezelni kell addig,

amíg a *C. parvum* okozta hasmenés kockázata fennáll.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap.

► KISZERELÉS

1 db 1000 ml-es (980 ml oldatot tartalmazó) műanyag palack 4 ml-es adagolópumpával.



LIVISTO



CRYPTISEL
0.5 mg/ml

BORJAK CRYPTOSPORIDIÓZISÁNAK
MEGELŐZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE



Along with you

Ecomectin

18,7 mg/g belsőleges paszta lovak részére A.U.V.

► HATÓANYAG

18,7 mg/g ivermektin

► JAVALLAT

Lovaknak a felsorolt fonálférgek, és/vagy ízeltlábú paraziták által okozott fertőzéseinek kezelésére.

Nagy strongylidák:

Strongylus vulgaris, *Strongylus edentatus* (adultok és L4 stádiumú lárvák) *Strongylus equinus* (adultok).

Kis strongylidák (beleértve a benzimidazol-rezisztens törzseket is):

Cyathostomum spp., *Cylicocyclus spp.*, *Cylicodontophorus spp.*, *Cylicostephanus sp.*, *Gyalocephalus spp.* (adultok és L4 stádiumú lárvák).

Orsóférgesek:

Parascaris equorum (L5 stádiumú lárvák és adultok).

Hegyesfarkú férgek: *Oxyuris equi* (L4 lárvák és adultok).

Filarioida nematoda:

Onchocerca spp. (mikrofilaria)

Gyomorbagócsok:

Gasterophilus spp. (szájüregbeli és gyomorbeli stádiumok).

► ADAGOLÁS

A fecskendőben az egy osztására jutó paszta 100 ttkg-ra elegendő, (a hatóanyag adagja 200 µg ivermektin/ttkg).

A fecskendő (7,49 g) teljes tartalma (hét osztás) elegendő egy **700 kg** testtömegű ló számára.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Ehető szövetek: 34 nap.

Nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő kancák kezelésére.

► KISZERELÉS

7,49 g/fecskendő

I V E R M E K T I N

700 kg

Orál paszta lovak részére



Elivec

5 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarhák részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Eprinomektin 5 mg/ml

► JAVALLAT

Szarvasmarha részére.

Gyomor- és bélférgek: *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia spp.*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia surnabada*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus helvetianus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Oesophagostomum spp.*, *Trichuris discolor*.

Tüdőférgek: *Dictyocaulus viviparus*.

Bőrbagócsok (parazita stádiumok): *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*.

Rühatkák: *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *Bovis*.

Szívótetvek: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurytenuis*, *Solenopotes capillatus*.

Rágótetvek: *Bovicola (Damalinia) bovis*

Bőrkölegek: *Haematobia irritans*.

A készítmény megvédi az állatokat az újrafertőződéstől:

Nematodirus helvetianus esetében

14 napig.

Trichostrongylus axei esetében 21 napig. *Dictyocaulus viviparus*, *Haemonchus placei*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia surnabada*, *Oesophagostomum radiatum* és *Ostertagia ostertagi* esetében 28 napig. A tartós hatékonyság időtartama változhat a *Cooperia spp.* és a *H. placei* esetében 14 nappal a kezelés után, különösen fiatal és sovány állatok kezelése esetében.

► ADAGOLÁS

Ráöntő (pour-on) alkalmazás. A készítmény csak helyileg alkalmazható 1 ml/10 ttkg adagban, ami megfelel 500 µg eprinomektin/ttkg dózishoz. A készítményt a gerinc mentén a martól a faroktőig terjedő vékony sávban kell alkalmazni.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap.

Tej: nulla óra.

► KISZERELÉS

1 liter



ELIVEC

5 mg/ml

A SZÉLESKÖRŰ VÉDELEM

Nulla napos várakozási idő



SPC

Espacox

**50 mg/ml belsőleges szuszpenzió sertések részére
A.U.V.**

► **HATÓANYAG**

Toltrazuril 50 mg/ml

► **JAVALLAT**

A kokcidiózis klinikai tüneteinek megelőzésére **újszülött malacoknál** (3-5 napos korban) olyan gazdaságokban, ahol a *Cystoisospora suis* (*Isospora suis*) által okozott kokcidiózis bizonyítottan előfordult.

► **ADAGOLÁS**

Szájon át alkalmazandó.
Az állatok egyedi kezelésére.

Minden malacnak 3-5 napos korban egyszeri 20 mg toltrazuril/testtömeg-kg adagot kell beadni, (ami megfelel 0,4 ml állatgyógyászati készítménynek testtömeg-kilogrammonként).

► **VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Hús és egyéb ehető szövetek: 73 nap.

► **KISZERELÉS**

1 liter

ESPACOX

50 mg/ml

SÚLYOS ÉRVEINK VANNAK

Toltrazuril orál szuszpenzió
malacoknak, mikronizált
formában



Along with you



Flubenzim

50 mg/g gyógypremix sertések és házityúk részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Flubendazol 50 mg/g

► JAVALLAT

Sertés: *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum dentatum*, *Trichuris suis*, *Metastrongylus apri* okozta fertőzések kezelésére.

Házityúk: *Capillaria obsignata*, *Ascaridia galli*, *Syngamus tracheae*, *Heterakis gallinarum*, *Trichostrongylus tenuis*, *Railettina cestillus* okozta fertőzések kezelésére.

► ADAGOLÁS

Szájon át, takarmányba keverve alkalmazandó.

Általános adag:

Sertés:

1,2 mg flubendazol/ttkg/nap 7-10 napig, ami megfelel 0,6 kg/tonna takarmány dózisnak.

Házityúk:

1,8 mg flubendazol/ttkg/nap 7 napig.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés:

Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap.

Házityúk:

Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojást termelő madarak kezelésére nem engedélyezett.

► KISZERELÉS

25 kg

FLUBENZIM 5%

gyógypremix A.U.V.

C CALIER



FLUBENDAZOL
hatóanyag



Megszakítja a férgek fejlődési ciklusát

Jól ismert termék, kiváló minőség

Hatékony a sertés valamennyi fontos endoparazitájának lárvaalakjai és petéi ellen is

Minden életkorban és vemhes kocáknál is alkalmazható



Ivergen Premium L.A.

oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Ivermektin 10,0 mg/ml

► JAVALLAT

Szarvasmarha alább felsorolt külső és belső parazitózisainak kezelésére:

Gyomor- és bélférgek: *Ostertagia ostertagi* (kifejlett és lárva), *Haemonchus placei* (kifejlett és lárva), *Cooperia punctata* (kifejlett és lárva), *Oesophagostomum radiatum* (kifejlett és lárva), *Nematodirus helvetianus* (kifejlett), *Strongyloides papillosus* (kifejlett), *Bunostomum phlebotomum* (kifejlett és lárva), *Toxocara vitulorum* (kifejlett). **Tüdőférgek:** *Dictyocaulus viviparus* (kifejlett és lárva). **Külső élősködők:** *Dermatobia hominis* (lárva), *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum* (lárva), *Chysomya bezziana* (lárva), *Psoroptes communis*, *Sarcoptes scabiei*, *Linognathus vituli*, *Haematopinus ewysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Boophylus microplus*, *Parafaaria bovicola*, *Thelazia spp.* (kifejlett).

Juh az alább felsorolt külső és belső parazitózisainak kezelésére: **Gyomor-bélférgek:** *Ostertagia circumcincta*, *O. trifurcata* (kifejlett és lárva), *Haemonchus contortus* (kifejlett és lárva), *Trichostrongylus axei* (kifejlett), *Tr. colubriformis*, *Nematodirus spp.* (lárva), *Cooperia curticei* (kifejlett és lárva), *Oesophagostomum spp.* (kifejlett), *Trichuris ovis* (kifejlett), *Chabertia spp.* (kifejlett).

Tüdőférgek: *Dictyocaulus filaria* (kifejlett), *Protostrongylus rufescens* (kifejlett).

Külső élősködők: *Oestrus ovis* (összes lárva stádium), *Psoroptes communis var. ovis*, *Sarcoptes scabiei var. ovis*.

Sertés alább felsorolt külső és belső

parazitózisainak kezelésére:

Gyomor- és bélférgek: *Ascaris suum* (kifejlett és lárva), *Hyostrongylus rubidus* (kifejlett és lárva), *Oesophagostomum spp.* (kifejlett), *Strongyloides ransomi* (kifejlett). **Tüdőférgek:** *Metastrongylus spp.* (kifejlett). **Veseférgek:** *Stephanurus dentatus* (kifejlett és lárva).

Külső élősködők: *Haematopinus suis*, *Sarcoptes scabiei var suis*.

► ADAGOLÁS

Alkalmazás módja: Kizárólag szubkután.

Szarvasmarha: 1 ml Ivergen Premium L.A. injekció/50 ttkg (200 µg ivermektin/ttkg). Az 500 kg-nál nehezebb állatoknál két helyre elosztva kell az adagot beadni. Egyetlen kezelés elégséges, megismételni nem szükséges.

Juh: 0,5 ml Ivergen Premium L.A. injekció/25 ttkg (200 µg ivermektin/ttkg).

Rühatkák elleni kezelés: 7 napos időközzel beadott két adag: adagonként 0,5 ml Ivergen Premium L.A. injekció/25 ttkg.

Sertés: 1,5 ml Ivergen Premium L.A. injekció/50 ttkg (300 µg ivermektin/ttkg). Egyetlen kezelés elégséges, megismételni nem szükséges. Egy injekciós helyre maximum 10 ml adható.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha (hús és egyéb ehető szövetek): 49 nap. Juh (hús és egyéb ehető szövetek): 35 nap.

Sertés (hús és egyéb ehető szövetek): 21 nap. A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett.

► KISZERELÉS: 50 ml, 500 ml

Ivergen Premium L.A.

injekció A.U.V.
Ivermektin



Tartós parazita-ellenes hatás



Vetimec

6 mg/g gyógypremix sertések részére

► HATÓANYAG

Ivermektin 6 mg/g

► JAVALLAT

Sertések parazita-ellenes kezelésére.

Fonálférges és/vagy izeltlábúak által okozott fertőzések kezelésére:

Gyomor- és bélrendszeri **orsóférgesek**: *Ascaris suum* (kifejlett és L4), *Hyostrogylus rubidus* (kifejlett és L4), *Oesophagostomum spp.* (kifejlett és L4), *Strongyloides ransomi* (kifejlett)*.

Tüdőférgesek: *Metastrongylus spp.* (kifejlett)

Tetű: *Haematopinus suis*.

Rüh: *Sarcoptes scabiei var. suis*.

*Vemhes kocáknak az ellés előtt adva hatékonyan megakadályozza az *S. ransomi*-nak a tejjel való átvitelét a malacokba.

► ADAGOLÁS

A megfelelő adag alkalmazása érdekében a testtömeget a lehető legpontosabban kell meghatározni. Az ajánlott adag 0,1 mg/ttkg ivermektin, naponta etetve, 7 egymást követő napon át. A készítmény megfelelő bekeverési aránya a kész takarmányba g/tonna arányban az alábbiak szerint számítható ki:

Gyógypremix bekeverési arány (g/tonna

takarmány) = $100 \times \frac{\text{átlagos testtömeg (kg)}}{6 \times \text{átlagos napi takarmányfelvétel (kg)}}$

Növendék sertések

A legfeljebb 40 kg-os sertések számára 333 g készítmény bekeverésével takarmány tonnánként 7 napon át. A 40 kg-os és annál nagyobb testtömegű sertések esetében 400 g/tonna takarmány adagban kell bekeverni 7 napon át.

Felnőtt sertések

Az ajánlott adagolás a 100 kg élősúly feletti kifejlett sertések esetén 1,67 kg készítmény/tonna takarmány 7 napon át. Ha a sertések száraz takarmány felvétele pontosan meghatározható, és minden kezelendő állat testtömege hasonló, akkor a bekeverési arány az előbbi képlettel kiszámítható és elérhető, hogy azok kizárólag a gyógyszeres takarmányt kapják.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ


Hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap.

► KISZERELÉS:

5 kg



VETIMEC
6 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V.
Ivermektin



Belső- és külső paraziták okozta fertőzések megelőzésére és kezelésére sertésekben



Vetimec

10 mg/ml oldatos injekció A.U.V.

► HATÓANYAG

Ivermektin 10 mg/ml

► JAVALLAT

Szarvasmarha: Húsmarhák és nem tejelő hasznosítású szarvasmarhák alább felsorolt paraziták által okozott fertőzéseinek kezelésére.

Gyomor-bélférgék (kifejlett férgek és negyedik stádiumú lárvák): *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora* (kifejlett férgek), *Cooperia oncophora* (kifejlett férgek), *Cooperia pectinata* (kifejlett férgek), *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*.

Tüdőféreg (kifejlett férgek és negyedik stádiumú lárvák): *Dictyocaulus viviparus*.

Szemféreg (kifejlett féreg): *Thelazia spp.*

Bagócsok (parazitikus stádiumok): *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*.

Rühatkák: *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*.

Vérszívó tetvek: *Linognathus vituli*, *Haematopinus ewystemus*, *Solenopotes capillatus*.

A kezelés védelmet nyújt az újrafertőződés ellen *Haemonchus placei*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia pectinata* és *Trichostrongylus axei* esetében a kezelést követő 7 napig, az *Ostertagia ostertagi* és *Oesophagostomum radiatum* esetében 14 napig, valamint a *Dictyocaulus viviparus* esetében 21 napig.

Juhok: *Psoroptes rühösség* (juh rühösség), valamint gyomor-bélférgék, tüdőférgék és az orrbagócsok okozta fertőzéseinek kezelésére.

Gyomor-bélférgék (kifejlett férgek): *Ostertagia circumcincta*, *Haemonchus contortus*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis* és *T. vitrius*, *Cooperia curticei*, *Nematodirus filicollis*. Változó mértékű hatékonyság figyelhető meg

Cooperia curticei és *Nematodirus filicollis* főnőférgék ellen.

Tüdőféreg: *Dictyocaulus filaria* (kifejlett férgek).

Rühatkák: *Psoroptes ovis*.

Orrbagócs: *Oestrus ovis* (valamennyi lárvastádium).

Sertések gyomor-bélférgék, tüdőférgék, tetvek és rühatkák okozta fertőzéseinek kezelésére.

Gyomor-bélférgék (kifejlett férgek és negyedik stádiumú lárvák): *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum spp.*, *Strongyloides ransomi* (kifejlett férgek). **Tüdőféreg:** *Metastrongylus spp.* (kifejlett férgek). **Tetvek:** *Haematopinus suis* **Rühatkák:** *Sarcoptes scabiei* var. *suis*.

► ADAGOLÁS

Kizárólag szubkutan, egyszeri alkalmazásra (kivéve a juhok *Psoroptes ovis* fertőzöttségének kezelését)

Szarvasmarha: 1 ml 50 ttkg-onként (ami megfelel 200 µg/ivermektin/ttkg-nak).

juhok: 0,5 ml 25 ttkg-onként (ami megfelel 200 µg/ivermektin/ttkg-nak).

Psoroptes ovis (juh rühösség) kezelésére a rühösség klinikai tüneteinek megszüntetéséhez és az élő rühatkák elpusztításához hét napos különbséggel beadott, két injekció szükséges.

Sertések: 1,5 ml 50 ttkg-onként (ami megfelel 300 µg/ivermektin/ttkg-nak).

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Ehető szövetek: szarvasmarha: 49 nap,

juh: 42 nap, sertés: 28 nap.

Nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt tej termelő tehenek és juhok kezelésére. Az ellést megelőző 60 napon belül nem alkalmazható tejelő, tejhasznosítású tehenekben és juhokban, beleértve a vemhes üszöket is.

► KISZERELÉS: 50 ml, 500 ml



VETIMEC
10 mg/ml oldatos injekció A.U.V.
Ivermektin



Minőség és gazdaságosság



EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK





► HATÓANYAG

Ketoprofen 100 mg/ml

► JAVALLAT

Szarvasmarha: heveny, fájdalommal járó és gyulladásos elváltozások, mint például mozgásszervi rendellenességek, ellési bénulás, bakteriális légzőszervi betegségek, és heveny klinikai tőgygyulladás kiegészítő kezelése, tőgyödéma csökkentése.

Ló: a mozgásszervek heveny fájdalommal járó és gyulladásos elváltozásainak kezelése; kólika tüneti kezelése.

► ADAGOLÁS

Szarvasmarha:

Intravénás vagy intramuszkuláris alkalmazásra.

3 mg ketoprofen/ttkg, ami megfelel 3 ml Ainil oldatos injekció A.U.V./100 ttkg-nak, naponta egyszer, 1-3 napon át.

Ló:

Kizárólag intravénás alkalmazásra.

Csont- és vázizomrendszeri vagy ízületi problémák esetén: 2,2 mg ketoprofen/ttkg, ami megfelel 1 ml Ainil oldatos injekció/

45 ttkg-nak naponta egyszer, 3-5 napon át.

Kólika tüneti kezelésére: 2,2 mg ketoprofen/ttkg, ami megfelel 1 ml Ainil oldatos injekció/45 ttkg-nak, egyszeri dózisban. További kezelés csak újabb klinikai vizsgálat után ajánlott.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha hús és egyéb ehető szövetek: i.m. kezelés után 4 nap, i.v. kezelés után nulla nap.

Tehéntej: nulla nap.

Ló hús és egyéb ehető szövetek: nulla nap.

► KISZERELÉS

100 ml

AINIL

MI LENNE, HA MEG TUDNÁD ÁLLÍTANI?

Ketoprofen oldatos injekció
szarvasmarhák és lovak számára



Along with you



Animeloxan

20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.

► HATÓANYAG

Meloxikám 20 mg/ml

► JAVALLAT

Szarvasmarha:

Heveny légzőszervi fertőzésben szenvedő szarvasmarhák kezelésére, megfelelő antibiotikum-terápiával együtt, a klinikai tünetek csökkentésére.

Hasmenés esetén az orális rehidratációs terápiával együtt, a klinikai tünetek csökkentésére, egy hétnél idősebb borjak és fiatal, nem laktáló szarvasmarhák kezelésére.

Heveny tüdőgyulladás (masztitisz) kiegészítő kezelésére antibiotikum-terápiával együtt. Borjak szarvtalanítása utáni fájdalom enyhítésére.

Sertés:

Nem fertőző eredetű mozgásszervi rendellenességeknél a sántaság és gyulladás tüneteinek csökkentésére. Kiegészítő terápiaként ajánlott a puerperális szepsziskémia és toxémia (masztitisz-metritisz-agalaktia szindróma) esetén, megfelelő antibiotikum-kezeléssel együtt.

Ló: A gyulladás és a fájdalom enyhítésére mind heveny, mind krónikus mozgásszervi rendellenességeknél. Kólikában szenvedő lovak fájdalmainak enyhítésére.

► ADAGOLÁS

Szarvasmarha: Egyszeri szubkután vagy intravénás injekció, 0,5 mg meloxikám/ttkg (azaz 2,5 ml/100 ttkg), antibiotikum-terápiával vagy orális rehidratáló terápiával kombinálva.

Sertés: Egyszeri intramuszkuláris injekció, 0,4 mg meloxikám/ttkg (azaz 2,0 ml/100 ttkg) dózisban, antibiotikum-kezeléssel kombinálva. Szükség esetén, 24 óra múlva egy második adag meloxikám is beadható.

Az injekciókat eltérő helyekre kell beadni.

Ló: Egyszeri intravénás injekció, 0,6 mg meloxikám/ttkg (azaz 3,0 ml/100 ttkg) adagban.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha: hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap, tej: 5 nap.

Sertés: hús és egyéb ehető szövetek: 8 nap.

Ló: hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő kancáknál nem engedélyezett.

► KISZERELÉS:

100 ml



ANIMELOXAN

20 mg/ml meloxikám

ÉS A GYULLADÁS MEGÁLL...



SPC **Aviacid liquid**

takarmány előkeverék gazdasági haszonállatok részére

► HATÓANYAG

Propionsav (E 280)	150.000 mg/kg
Hangyasav (E 236)	125.000 mg/kg
Ecetsav (E 260)	85.000 mg/kg
Almasav (E 296)	25.000 mg/kg
Citromsav (E 330)	10.000 mg/kg
Tejsav (E 270)	10.000 mg/kg
Foszforsav (E 338)	22.500 mg/kg
Szorbinsav (E 200)	2.000 mg/kg

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

► KISZERELÉS

25 kg

► JAVALLAT

Savanyítószer.

A termék savas kémhatású, használatával kedvező feltételek teremthetők a gyomor- és vékonybélmemésztés folyamatában.

Az alacsony pH biztosítja a bélflóra működéséhez szükséges optimális feltételeket, javítja az emészthetőséget, ezáltal javítja a takarmányok hasznosulását.

► ADAGOLÁS

0,5-3 kg/1000 liter ivóvíz.

AVIACID LIQUID

Komplex savanyító, a szerves és szervetlen savak optimális kombinációja



Azix forte

tartósító, savanyító és pH csökkentő takarmány adalékanyag

► **HATÓANYAG**

orto-foszforsav (E 338) 70 %
hangyasav (E236) 10%

► **VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Nem értelmezhető.

► **JAVALLAT**

Valamennyi állatfaj részére.

Tartósító, savanyító pH csökkentő takarmány adalékanyag valamennyi állati takarmány alapanyagba, késztakarmányba és ivóvízbe.

► **KISZERELÉS**

25 kg

► **ADAGOLÁS**

50-100 ml/1000 kg takarmány.

Adagolása lehetséges egyedi kiméréssel vagy adagoló pumpával.

A HATÉKONY SAVANYÍTÓSZER

Azix®
forte

EFICACIA PROBADA POR NORMAS UNE
OFICIALES EUROPEAS

Savanyítás = egészséges bélrendszer

Bizonyított hatékonyság minőségi hatóanyagokkal



Biocidas Biodegradables ZIX

Boviestimul

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

► HATÓANYAG

Száritott sörélesztő 35%; keményítő 20,5%; kazein 15%; dextróz 8,5%; kalcium-karbonát 5,26%; dinátrium-foszfát 5%; monokalcium-foszfát 3,67%

Analitikai összetevők:

Nyersfehérje 31,2%; nyersolajok és zsírok 1,3%; nyersrost 0,4%; nyershamu 1,1%; foszfor 2,5%; nátrium 1,5%

Adalékanyagok/kg:

Bélflóra stabilizálók: *Saccharomyces cerevisiae*: 4×10^{11} CFU, kobalt (granulált bevont kobalt): 100 mg, DL-metionin, ipari tisztaságú: 30 g; Lizin/L-lizin-mono-hidroklorid, ipari tisztaságú: 5 g

► JAVALLAT

Szarvasmarhák részére. Az emésztés javításával és a bendő (mikroflóra) optimális működésének biztosításával fokozza a kérődzők termelését. Segítségével megelőzhetőek a (takarmányváltással kapcsolatos) emésztési zavarok, a bendőrenyheség vagy a felfúvódás. Serkenti az anaerob, a cellulóz-bontó és a tejsav-fogyasztó bendő baktériumok szaporodását. Stabilizálja a bendő pH-ját, javítja a növényi rostok emészthetőségét, az illózsírsavak és a mikroorganizmus

eredetű fehérjék termelődését. A fentiek segítségével nő a napi testtömeg-gyaparpodás és a tejtermelés.

► ADAGOLÁS

3 kg Boviestimul/tonna takarmány.

Szarvasmarha egyedi kezelés:

25-50 g/12 óránként/10-15 napon át.

Figyelmeztetés!

Tejelő tehenek: A napi takarmányadag *Saccharomyces cerevisiae* tartalma nem haladhatja meg a $8,4 \times 10^9$ CFU-t 100 ttkg mennyiséget és minden további 100 ttkg-hoz $1,8 \times 10^9$ CFU-t kell hozzáadni.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmethető.

► KISZERELÉS

500 g

BOVI-ESTIMUL



BOVI-ESTIMUL



www.livisto.com



► HATÓANYAG

Kalcium-glükonát	190 mg/ml
Kalcium-glükoheptonát	45 mg/ml
Kalcium-d-szacharát	10 mg/ml
Magnézium-klorid-hexahidrát	60 mg/ml
Nátrium-hipofoszfít	30 mg/ml

► JAVALLAT

Szarvasmarha, juh: heveny és idült hipokalcémia, ellési bénulás, angolkór, csontlágyulás, csonttritkulás esetén.

Kutya: hipokalcémia (az ellést követő bénulás), angolkór, csontlágyulás, mérgezések, valamint a kalcium- és foszfor anyagforgalom rendellenességeivel kapcsolatos összes kórkép.

► ADAGOLÁS

Intramuszkuláris vagy lassú intravénás alkalmazás.

Tájékoztató jelleggel a következő napi adagolás javasolható:

Felnőtt szarvasmarha: 200-400 ml/állat (12 mg kalcium/ttkg, 3,5 mg magnézium/ttkg és 6 mg foszfor/ttkg)

Juh: 25-50 ml/állat (13,5 mg kalcium/ttkg, 4,5 mg magnézium/ttkg és 6,5 mg foszfor/ttkg).

Kutya: 2-20 ml/állat (15 mg kalcium/ttkg, 5. mg magnézium/ttkg és 7,4 mg foszfor/ttkg).

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha, juh hús és egyéb ehető szövetek: nulla nap.

Tej: nulla nap.

► KISZERELÉS

500 ml

CALCIOVET



Az állatok élettanában és metabolizmusában fontos ionok, különösen a vemhesség és a tejtermelés időszakában



Dalmarelin

25 mikrogramm/ml oldatos injekció szarvasmarhák és házinyulak részére

► HATÓANYAG

lecirelin - 25 µg (mint lecirelin-acetát)

► JAVALLAT

Szarvasmarha:

- Petefészek tüszőciszták kezelése
- Ciklusindukció tehenekben az ellés után rövid idővel, az ellés utáni 14. naptól
- Ovuláció kiváltása inszeminációkor rövid, csendes vagy elhúzódó ivarzás esetén
- Ovuláció kiváltása ciklusban lévő teheneknél mesterséges termékenyítésnél az ovuláció időpontjának optimalizálására
- Ivarzás és ovuláció kiváltása és szinkronizálása prosztaglandin-F2α (PGF2α) vagy PGF2α analóg készítménnyel kombinációban, progeszteronnal vagy anélkül, rögzített időpontú mesterséges termékenyítés (FTAI) protokoll részeként

Házinyúl:

- Ovuláció kiváltása
- A termékenyülési ráta növelése

► ADAGOLÁS

Intramuszkuláris alkalmazás.

Az adagolás az állatfajtól és az indikációtól függően változik.

Szarvasmarha esetén az általános adag 50 µg lecirelin, ami megfelel 2 ml/tehen adagnak. Egyéb protokollok is alkalmazhatók az állomány adottságaitól függően. Az adott állomány jellemzőinek függvényében a kezelő állatorvosnak kell eldöntenie, hogy melyik protokollt alkalmazzák.

Házinyúl esetén az ovuláció kiváltása: 0,2 ml, a termékenyülési ráta növelése: 0,3 ml

A kezelés az ellés után 24 órával alkalmazható. A kezelés után azonnal meg kell történnie a párzásnak vagy az inszeminációnak.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Ehető szövetek és tej: 0 nap.

► KISZERELÉS

20 ml



Dalmarelin

25 µg/ml lecirelin



Új korszak
a szarvasmarha-tenyésztésben!



Dalmazin SYNC

0.075 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.

► HATÓANYAG

d-kloprosztenol (nátrium só formájában)
75,0 µg/ml

► JAVALLAT

Tehén:

Ivarzás-szinkronizáció és ivarzásindukció. Ellésindukció a vemhesség 270. napja után.

Petefészek-működési zavarok kezelése (perzisztáló sárgatest, luteális ciszták). Klinikai tünetekben megnyilvánuló méhgyulladás kezelésére, gennyes méhgyulladás és funkcionáló sárgatest jelenléte esetén.

Vetélés kiváltása a vemhesség 150. napjáig.

Mumifikált magzat eltávolítása.

Elhúzódó méhinvolúció kezelésére.

Koca:

Ellésindukció a vemhesség 114. napja után.

Kanca:

Luteolízis kiváltása működő sárgatesttel rendelkező kancákban.

► ADAGOLÁS

Napi adagja tejelő tehenek esetén 2 ml, amely megfelel 150 µg d-kloprosztenolnak. Üszőknek 1 ml injekciót kell adni, amely megfelel 75 µg d-kloprosztenol.

Kocáknak 1 ml injekciót kell adni, amely megfelel 75 µg d-kloprosztenol.

Kancák esetén 1 ml injekciót kell adni, amely megfelel 75 µg d-kloprosztenol.

Az injekciót valamennyi állatfaj esetén intramuszkulárisan, mélyen az izomba kell beadni.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés (ehető szövetek): 1 nap

Szarvasmarha ehető szövetek és tehéntej: 0 nap.

Ló ehető szövetek 2 nap, tej 0 nap.

► KISZERELÉS

20 ml



Dalmazin SYNCH

75 µg/ml d-kloprosztenol



Új korszak az állattenyésztésben!

Day One Zix

csibezselé

► **HATÓANYAG**

Propilén-glikol, nátrium-klorid, dextróz, nátrium-bikarbonát, magnézium-klorid, a Rhodophyceae osztályba tartozó vörösmoszat-liszt

► **JAVALLAT**

Napos baromfiak energia- és ásványi-anyag pótlására

► **ADAGOLÁS**

5 kg-os zsák 4000-8000 csibének elegendő

► **VÁRAKOZÁSI IDŐ**

0 nap

► **KISZERELÉS**

5 kg



Day One Zix

Csibezselé



DEXAFAST

oldatos injekció lovaknak, szarvasmarháknak, sertéseknek, kutyáknak és macskáknak

► HATÓANYAG

Dexametazon 2 mg/ml

► JAVALLAT

Ló, szarvasmarha, sertés, kutya, macska: gyulladásos vagy allergiás állapotok kezelése.

Szarvasmarha: ellés beindítása, elsődleges ketózis (acetonémia) kezelése.

Lovak: artritisz, burzitisz vagy ínhüvelygyulladás kezelése.

► ADAGOLÁS

Alkalmazási módok:

Ló: Intravénás, intramuszkuláris vagy intraartikuláris alkalmazás.

Szarvasmarha, sertés, kutya, macska: Intramuszkuláris alkalmazás.

Gyulladásos vagy allergiás állapotok kezelése:

Ló, szarvasmarha, sertés: 0,06 mg dexametazon/ttkg, megfelel: 1,5 ml/50 kg.

Kutya, macska: 0,1 mg dexametazon/ttkg, megfelel: 0,5 ml/10 kg.

Elsődleges ketózis (acetonémia) kezeléséhez szarvasmarhánál:

0,02-0,04 mg dexametazon/ttkg, amely megfelel 500 ttkg-onként 5-10 ml készítménynek, izomba adható injekció formájában javasolt alkalmazni a tehen

méretétől és a tünetek időtartamától függően. A nagyobb dózisra (legfeljebb 0,06 mg dexametazon/kg) van szükség, hosszabb ideje fennálló tünetek esetén vagy, ha visszaeső állatokat kezelnek.

Az ellés beindítása szarvasmarhánál:

ttkg-onként 0,04 mg dexametazon, amely 500 ttkg-onként 10 ml készítménynek felel meg, a vemhesség 260. napja után egyszer izomba adandó injekcióként.

Az ellés általában 48-72 órán belül megindul.

Artritisz, burzitisz vagy ínhüvelygyulladás kezelése lovaknál: ízületbe adható injekció formájában 1-5 ml.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha hús és egyéb ehető szövetek: 2 nap

Tehéntej: 72 óra

Sertés: 2 nap.

Ló: 8 nap. A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő lovaknál nem engedélyezett.

► KISZERELÉS

100 ml



DEXAFAST

2 mg/ml

GYORSASÁG ÉS ERŐ

» **Gyors hatás**
» **Kiemelkedően erős gyulladáscsökkentő**
» **Intravénásan is adható**



Energyn

kiegészítő takarmány gél újszülött malacok részére

► HATÓANYAG

Kókuszolaj 15%, szójaolaj 12,5%, és 72,5% egyéb zsírsavak keveréke, amelyek a következőknek felelnek meg: kaprilsav 44%, kaprinsav 24%, laurinsav 8,8%, linolsav 7,2%, olajsav 3,6%, mirisztinsav 3,6%, palmitinsav 2,8%, kapronsav 1,4%, linolénsav 1%

► JAVALLAT

Sertés (**újszülött malac**) részére energiapótló készítmény.

Gyenge és/vagy kis testtömegű (1 kg alatti testtömegű) újszülött malacok számára: a mihamarabbi kolosztrumhoz jutás érdekében, valamint az almon belüli verekedés és a hypotermia megelőzésére.

► ADAGOLÁS

Szájon át 1 nyomás (2 ml) naponta egyszer az élet első napján.

Szükség esetén a második napon ismételtethető.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

► KISZERELÉS

6x 100 ml kartondobozban, adagolóval ellátott polietilén palack.



ENERGYN gél

Amitől **beindul a malac**

ENERGYN kiegészítő takarmány (gél) újszülött malacok részére



GYÓGYSZER MINŐSÉGŰ ENERGIA PÓTLÓ

Fintox maxi

takarmány adalékanyag előkeverék kérődzők, baromfi és sertés részére

► HATÓANYAG

Sepiolit agyag (magnézium-szilikát, E-563) 95,24%, aflatoxin B1 szennyezést redukáló anyag: bentonit 2,5%

Vitaminok, provitaminok és analógjaik: betain-hidroklorid 1%, L-karnitin L-tartarát 0,01%

Aroma anyagok keveréke: 1,15%

► JAVALLAT

Kérődzők, baromfi és sertés részére. Szilikát adszorbens növényi kivonatokkal, amely a toxinkötő hatás mellett immunstimuláló és hepatoprotektív hatást fejt ki. A készítményben található agyag- és szilikátfélék gondos válogatásával és fejlesztésével biztosítható a széles spektrumú hatás. Ezek az alapanyagok a fizikai és kémiai tulajdonságaik révén irreverzibilis és nem emészthető komplexeket képeznek a gombatoxinokkal, melyek aztán - felszívódás nélkül, a bélsárral kiürülve - távoznak el a gyomor-bélrendszerből. A FINTOX adalékanyag olyan átfogó megoldást kínál a mikotoxikózissal kapcsolatos problémákra, amely ötvözi a különböző hatásmechanizmusokat annak érdekében, hogy minden állatfajnak hatékony védelmet biztosítsanak a

mikotoxinok minél szélesebb köre ellen. A FINTOX MAXI aflatoxin kötőképessége 99,8 %.

► ADAGOLÁS

Kizárólag állati takarmányokba. Takarmányba keverés lehetséges gombatoxin fertőzöttség esetén: 1-2,5 kg FINTOX MAXI/tonna takarmány. A szájon át adott makrolidokkal antibiotikumokkal történő együttes adagolást kerüljük.

Baromfi esetén: a robenidinnel történő együttes adagolást kerüljük.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

► KISZERELÉS

25 kg



Fintox Maxi



Kifejezett májvédő hatás

Legjobb minőségű sepiolit agyagásvány anyagokkal

Növényi kivonatokkal és betainnal

Aflatoxin B1 kötőképesség: 99,8%

DON toxinkötő képesség: 94%



Fintox Pro Advance

takarmány adalékanyag előkeverék kérődzők, baromfi és sertés részére

► HATÓANYAG

Kötőanyagok: sepiolit agyag (magnézium-szilikát, E-563) 69%, kaolin tartalmú agyag (aluminium-szilikát, E-559) 10%, aroma anyagok keveréke: 10%, vitaminok, provitaminok és analógjaik: betain hidroklorid 2,5%, L-karnitin L-tartarát 0,25%, aflatoxin B1 szennyezést redukáló anyag: bentonit 2,5%, mannán- és frukto oligoszacharidok, valamint tengeri hínár liszt

► JAVALLAT

Kérődzők, baromfi és sertés részére.

Szilikát adszorbens növényi kivonatokkal, amely a toxinkötő hatás mellett immunstimuláló és hepatoprotektív hatást fejt ki.

A készítményben található agyag- és szilikátfélék gondos válogatásával és fejlesztésével biztosítható a széles spektrumú hatás. Ezek az alapanyagok - a fizikai és kémiai tulajdonságaik révén - irreverzibilis és nem emészthető komplexeket képeznek a gombatoxinokkal, melyek aztán - felszívódás nélkül, a bélsárral kiürülve - távoznak el a gyomor-bélrendszerből.

A készítmény fitobiotikumokat és olyan anyagokat tartalmaz, amelyek ellensúlyozzák a gombatoxin-szennyezés káros hatásait állatokban. Ezek természetes antioxidáns szerek, amelyek megsemmisítik a toxinterhelés által generált szabad gyököket. A fitobiotikumok és gyógyhatású összetevőik képesek a gombatoxinok okozta immunszuppressziót májkárosodást megelőzni és a regenerációt segíteni.

A FINTOX PRO ADVANCE komplex hatást fejt ki a gombatoxinokra és más endotoxinokra. Komplex

összetétele lehetővé teszi a vízben oldódó, a zsírban oldódó és nem oldódó mérgeanyagok eltávolítását a szervezetből. Az élettani hatással rendelkező növényi kivonatai javítják az állatok egészségét. Természetes antioxidánsai gyulladásgátló és immunmoduláló hatásúak. Kifejezetten az érzékenyebb és a legnagyobb genetikai potenciállal rendelkező állatok számára ajánlott.

A készítmény hatóanyagainak jellemzői:

Válogatott agyagásványok és sejtfal-kivonatok magas toxinkötő képességgel. Gombatoxin bio-transzformációs tulajdonságokkal rendelkező enzimek.

Fruktooligoszacharidok, amelyek támogatják a normális mikroflóra működését és segítik annak helyreállítását.

Máriatövis (*Silybum marianum*) és articsóka (*Cynara scolymus*) növényi kivonata, mely májvédő és vízhajtó hatású.

Betain, amely hepatoprotektív és regeneráló hatást fejt ki a sejtekre.

Vörös szőlőkivonat, amely antioxidánsként a szabad gyökök eltávolításáért felelős.

► ADAGOLÁS

Kizárólag állati takarmányokba.

A FINTOX PRO ADVANCE TAKARMÁNYBA KEVERÉSE: Lehetséges gombatoxin fertőzöttség esetén: 1-2 kg FINTOX PRO ADVANCE/tonna takarmány.

A szájon át adott makrolidokkal antibiotikumokkal történő együttes adagolást kerüljük. Baromfi esetén: a robenidinnel történő együttes adagolást kerüljük.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

► KISZERELÉS: 25 kg



Fintox Pro Advance



Széles spektrumú toxinkötő

Detoxikáló és penészgomba-gátló hatás

Kifejezett májvédő hatás



Glucosal

különleges táplálási igényeket kielégítő, diétás kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, gidák és csikók részére

► HATÓANYAG

Dextróz:	81,7 %
Nátrium-klorid:	10 %
Nátrium-citrát:	5 %
Kálium-klorid:	1 %
Kalcium-klorid:	0,3 %

Analitikai összetevők:

Nedvességtartalom:	10 %
Nyersfehérje:	0 %
Nyersolajok és zsírok:	0%
Nyersrost:	0 %
Nyershamu:	15,5 %
Összcukor:	75 %
Kalcium:	0,08 %
Foszfor:	0 %
Nátrium:	5,11 %
Kálium:	0,52 %
Klorid:	6,69 %

► JAVALLAT

Só- és vízháztartás stabilizálására szolgáló, elektrolit és energiapótló készítmény, emésztési zavarok megelőzésére, emésztési zavarok tartama alatt vagy abból való felépüléskor.

Alkalmazás előtt kérje ki állatorvosa tanácsát.

► ADAGOLÁS

10-30 g/liter ivóvíz, vagy 50 g/kg takarmány 1-7 napon át (csak önmagában alkalmazva 1-3 napon át).

► VÁRAKOZÁSI IDŐ


Nem értelmezhető.

► KISZERELÉS

100 g

DFV[®]
Group DIVASA-FARMAVIC

ENERGIA



elektrolitok

= GLUCOSAL

A HASMENÉS okozta rehidráció komplex kezelésére



HIDRALIP

diétás takarmány kiegészítő borjú, malac, bárány, csikó, valamint egyéb fiatal állatoknak

► HATÓANYAG

Glükóz-monohidrát (dextróz), nátrium bikarbonát, mononátrium foszfát, magnézium szulfát, KCl, NaCl.

Tartósítószer: citromsav

Garantált beltartalmi értékek:

Klorid ionok: 2,5%, Nátrium 2.5%,
Kálium: 0.4%, Foszfor: 0.26%

Vitaminok és egyéb anyagok 1 kg termékben:

Vitamin A (3a672a): 160.000 U.I.

Vitamin C (3a300): 4g

Betain-hidroklorid (3a925): 10.000 mg

ízanyagok 20 g

► JAVALLAT

A víz és elektrolit egyensúly stabilizálására a fiziológiás emésztés támogatása érdekében.

Emésztési zavar (hasmenés) veszélye, időszakokban vagy az azokból való felépülés esetén.

► ADAGOLÁS

A bekeverési arány soha ne haladja meg az 50g/l arányt!

Borjú:

A tejtatás alatt 1-7 napig.

Borjak fogadása esetén: 50g/liter dózisban az ivóvízben feloldva naponta kétszer (reggel, este).

Enyhe hasmenés: 50%-ban Hidralip 50 g/l oldat + 50%-ban tejpótló folyadék itatása javasolt.

Súlyos hasmenés: Hidralip 50g/liter ivóvíz dózisban, kizárólagosan vízforrásként javasolt.

Szállítás esetén: a szállítás napján itassunk 2%-os Hidralip oldatot.

Malac, bárány, csikó és egyéb kölyök állatok: 1-7 napon át, hasmenés esetén itassunk 5%-os Hidralip oldatot a tünetek elmúltáig.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

0 nap

► KISZERELÉS

1 kg



HIDRALIP

Diétás takarmánykiegészítő



Liptosa ...the green way of life



New Science ZnO

mikrokapszulázott cink-oxid tartalmú takarmány előkeverék valamennyi állatfaj részére

► HATÓANYAG

Cink-oxid: 50 %, kalcium-formiát (feed grade), fokhagyma (Allium-félék) kivonata, hidrogenizált növényi olaj (vivőanyag) Nátrium-butiráttal bevont, nanoméretű cink-oxid (ZnO) szemcsék

► JAVALLAT

Az ADIZOX-ban található ZnO szemcse-mérete, illetve a ható- és vivőanyagok közötti szinergizmus kiváló hatékonyságot biztosít a malacok bélrendszerében.

A bélrendszerben közvetlenül és könnyen értékesülő, védett cink-oxidot (ZnO) tartalmazó takarmány előkeverék.

Esszenciális nyomelem, cinkforrás.

Segít megakadályozni a választáskori és a kora hízókori hasmenés kialakulását.

A patogén coliform baktériumok kolonizációját gátolja, ezáltal elősegíti az egészséges bélflóra kialakulását.

► ADAGOLÁS

Szájon át, (kizárólag állati) takarmányba keverve.

A bekeverésnél figyelembe kell venni az egyéb takarmánykomponensek cinktartalmát!

Általános adagolás:


300 g/tonna takarmány.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

0 nap.

► KISZERELÉS

10 kg



New Science ZnO

Mikrokapszulázott cink-oxid tartalmú takarmány előkeverék 50% cink-oxid

(nátrium-butiráttal bevont, nanoméretű ZnO szemcsék)



Niglumine

50 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha, sertés és ló részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Flunixin 50 mg/ml, flunixin-meglumin formájában (ami megfelel 82,9 mg flunixin-meglumnak)

► JAVALLAT

Szarvasmarha: Heveny légzőszervi fertőzések klinikai tüneteinek enyhítésére, megfelelő antibiotikum terápiával együtt alkalmazva.

Sertés: Az MMA-szindróma (mastitis, metritis, agalactia) klinikai tüneteinek enyhítésére, megfelelő antibiotikum terápiával együtt alkalmazva.

Ló: A váz- és izomrendszeri megbetegedések során fellépő gyulladás és fájdalom csökkentésére, elsősorban akut-szubakut stádiumban, valamint a kólikát kísérő görcsös fájdalom enyhítésére.

► ADAGOLÁS

Alkalmazás módja:

Szarvasmarha és ló: intravénásan.

Sertés: intramuszkulárisan.

Szarvasmarha: 2,2 mg flunixin/ttkg/nap (2 ml NIGLUMINE injekció/45 ttkg/nap) intravénásan, a betegség lefolyásától függően 24 óránként ismételve, maximum 3 egymást követő napon át.

Sertés: 2,2 mg flunixin/ttkg/nap (2 ml

NIGLUMINE injekció/45 ttkg) intramuszkulárisan, 12 óránként adva, maximum két alkalommal, megfelelő antibiotikum terápia mellett.

A lokális irritáció csökkentése érdekében egy helyre legfeljebb 5 ml injekció beadása javasolt.

Ló: 1,1 mg flunixin/ttkg/nap (1 ml NIGLUMINE injekció/45 ttkg/nap) intravénásan, a betegség lefolyásától függően 24 óránként ismételve, maximum 5 egymást követő napon át.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha (hús és egyéb ehető szövetek): 4 nap.

Tehéntej: 24 óra.

Sertés (hús és egyéb ehető szövetek): 28 nap.

Ló (hús és egyéb ehető szövetek): 28 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő lovaknál nem engedélyezett.

► KISZERELÉS

100 ml



Niglumine®

Flunixin meglumine 50,0 mg

Anti-inflammatory · Analgesic · Antipyretic



Utánozhatatlan hatékonyság

FÁJDALOM

GYULLADÁS

LÁZ



Amikor a láz, a fájdalom és a gyulladás együtt jár...



► HATÓANYAG

Oxitocin 10 NE/ml

► JAVALLAT

Uterotonicum.

Ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, kutya, macska kezelésére a következő esetekben:
Ellés indukálása, méhatónia, elhúzódó ellés, fájásgyengeség esetén.

Metrorrhagia, császármetszés esetén a méh vérzésének megszüntetésére.

Ellés után a lochia kiürülésének elősegítésére. Metritis, pyometra, magzatburok retenció kezelésére.

Tőgygyulladás esetén az antibiotikum terápia kiegészítéseként (azt megelőzően) a tejmirigy teljes kiürülésének elősegítésére.

Agalactia esetén a tejtermelés megindítására.

Kocák MMA szindrómájának kiegészítő kezelésére.

► ADAGOLÁS

Intramuszkuláris vagy szubkután.

Tehén: 5-7 ml (50-70 NE)/állat

Kanca: 5-7 ml (50-70 NE)/állat

Sertés: 3-5 ml (30-50 NE)/állat

Juh: 1-2 ml (10-20 NE)/állat

Kecske: 1-2 ml (10-20 NE)/állat

Kutya: 0,5-1 ml (5-10 NE)/állat

Macska: 0,6 ml (6 NE)/állat

Szükség esetén a dózis beadása 30 perc múlva megismételhető.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés
ehető szövetek: 0 nap.

► KISZERELÉS

100 ml és 250 ml

PARTOVET

Oxitocin 10 NE/ml



A minőségi uterotonicum



Pluset

por és oldószer oldatos injekcióhoz A.U.V.

► HATÓANYAG

Egy üveg liofilizált készítmény tartalmaz:
Folliculus stimuláló hormon (FSHp) 500 NE
Luteiniláló hormon (LHp) 500 NE

Az elkészített oldat tartalmaz ml-ként:
Folliculus stimuláló hormon (FSHp) 50 NE
Luteiniláló hormon (LHp) 50 NE

► JAVALLAT

Teheneknél a szuperovuláció kiváltására.

► ADAGOLÁS

Alkalmazási módok:

Kizárólag intramuszkulárisan alkalmazandó.

Egy üveg liofilizátumot 10,5 ml oldószerben kell feloldani. Az oldat elkészítésekor és az adagok üvegből való felszívásakor aseptikus körülményeket kell biztosítani. Enyhe rázással kell segíteni az oldódást.

A **javasolt teljes dózis:** 800 - 1000 NE, csökkenő adagban 4-5 napon át a használati utasításban szereplő adagolási javaslat szerint. A dózist az állatok közötti egyedi különbségek és a fajta, az életkor és a reprodukciós státusz

figyelembevételével kell beállítani.

Üszőknek és húshasznú teheneknek a teljes ajánlott dózis 800 NE.

Tejelő teheneknek a dózist fel lehet emelni 1000 NE-re, figyelembe véve az életkort, az ellések számát és a tejtermelést.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha hús és egyéb ehető szövetek: 0 nap.

Tehéntej: 0 nap.

► KISZERELÉS

Kartondoboz, benne 2 db 10 ml-es liofilizált készítményt tartalmazó injekciós üveg és 1 db 21 ml oldószert tartalmazó üveg.



Pluset®

Tisztított sertés agyalapi-mirigy gonadotropinok
Az eredmények önmagukért beszélnek



Szuperovuláció
felső fokon

Suifertil

4 mg/ml belsőleges oldat sertések részére A.U.V.

► HATÓANYAG

Altrenogeszt 4,00 mg/ml

► JAVALLAT

Ivarérett **kocasüldők** ivarzásának szinkronizálására.

► ADAGOLÁS

Szájon át alkalmazandó, takarmányra juttatással.

20 mg altrenogeszt/állat (azaz 5 ml készítmény/állat) naponta egyszer, 18 egymást követő napon át.

Az állatokat el kell különíteni és egyedileg kell kezelni.

A készítményt a takarmány felületére kell juttatni közvetlenül a takarmány elfogyasztása előtt. A megmaradt takarmányt meg kell semmisíteni.

A kezelt ivarérett kocasüldők nagy része a 18 egymást követő napi kezelés után 5-6 nappal kezd ivarzni.

A készítmény adagolásához kizárólag a Suifertil adagolópumpa használható.

Az adagolópumpa feltöltéséhez tartsa függőlegesen a tartályt, lassan nyomja le

az adagoló ravaszát, amíg a cső végén egy csepp meg nem jelenik.

Ezt követően az adagoló 5 ml-es adagot juttat ki minden egyes teljes lenyomással. Az adagolót végig a palackon kell hagyni, és a kezeléseket között az adagoló zárórendszerét lezárva kell tartani.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Hús és egyéb ehető szövetek: 9 nap.

► KISZERELÉS

1 liter

SUIFERTIL

4 mg/ml altrenogeszt

Te döntöd el, hogy mikor!



Veteglan

0,075 mg/ml oldatos injekció tehenek, kocák és kancák számára A.U.V.

► HATÓANYAG

d-kloprosztenol (nátrium só formájában)
75,0 µg /ml

► JAVALLAT

Tehén: ivarzás-szinkronizáció és ivarzásindukció.

Ellésindukció a vemhesség 270. napja után.

Petefészek-működési zavarok kezelése (perzisztáló sárgatest, luteális ciszták).

Klinikai tünetekben megnyilvánuló méhgyulladás kezelésére pyometra és funkcionáló sárgatest jelenléte esetén.

Vetélés kiváltása a vemhesség 150. napjáig.

Mumifikált magzat eltávolítása.

Elhúzódó méhinvolúció.

A petefészekciszta kezelésével összefüggő terápia (9-14 nappal a GnRH vagy analógja adása után).

Koca: ellésindukció a vemhesség 114. napja után.

Kanca: luteolízis kiváltása működő sárgatesttel rendelkező kancákban.

► ADAGOLÁS

Napi adagja **tejlő tehenek** esetén 2 ml, amely megfelel 150 µg d-kloprosztenolnak.

Üszőknek és **kocáknak** 1 ml injekciót kell adni, amely megfelel 75 µg d-kloprosztenol.

Kancák esetén 1 ml injekciót kell adni, amely megfelel 75 µg d-kloprosztenol. Az injekciót intramuszkulárisan, mélyen az izomba kell beadni.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés (ehető szövetek): 1 nap

Szarvasmarha ehető szövetek és tehenet: 0 nap.

Ló ehető szövetek 2 nap, tej 0 nap.

► KISZERELÉS

20 ml

VETEGLAN

75,0 µg /ml d-kloprosztenol
(nátrium só formájában)



Veterelin

0.004 mg/ml injekció szarvasmarhák, lovak, sertések és nyulak számára A.U.V.

► HATÓANYAG

buszerelin (acetát só formájában)
0,004 mg/ml

► JAVALLAT

Szarvasmarha (tehén):

- Az ovuláció kiváltására vagy késleltetésére, az anösztrusz kezelésére, a nimfomania tüneteivel kísért vagy anélkül jelentkező petefészekciszták gyógykezelésére.
- A fogamzási ráta növelésére mesterséges temékenyítés esetén, PGF2a analóg alkalmazásával történő ösztrusz-szinkronizáció után is.

Ló (kanca):

- Ovuláció kiváltására, illetve az ovuláció és a fedeztetés idejének szinkronizálására.
- Nimfomania tüneteivel kísért vagy anélkül jelentkező petefészekciszták gyógykezelésére.

Sertés (kocasüldő):

Az ovuláció kiváltására az ivari ciklus progeszteron-analóg (altrenogeszt) alkalmazásával történő szinkronizálása után, az egyszeri mesterséges termékenyítés érdekében.

Nyúl (nőstény nyúl):

- A fogamzási ráta növelésére és az ovuláció kiváltására posztpartum inszemináláskor.

► ADAGOLÁS

Szarvasmarha: 10-40 µg buszerelin/állat, ami megfelel 2,5-10 ml Veterelin/állat adagnak. A dózist a javallatnak megfelelően kell kiválasztani.

Ló: 40 µg buszerelin/állat, ami megfelel 10 ml Veterelin/állat adagnak.

Sertés: 10 µg buszerelin/állat, ami megfelel 2,5 ml Veterelin/állat adagnak.

Nyúl: 0,8 µg buszerelin/állat, ami megfelel 0,2 ml Veterelin/állat adagnak.

► VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés (ehető szövetek): 0 nap.

Szarvasmarha ehető szövetek és tehéntej: 0 nap.

Ló ehető szövetek 0 nap, tej 0 nap.

► KISZERELÉS

20 ml



VETERELIN®



C CALIER



TERMÉKKATALÓGUS 2026

DUNAVET-B Zrt.

7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5-9.

Tel.: +36 75 542-940, Fax: +36 75 542-941

titkarsag@dunavet.hu

www.dunavet.hu



Borítókép: „HÚÚ” nevű, Charolais x Longhorn x Brahma fajtájú rodeo-bika

Tulajdonos: Magyar Rodeo Egyesület

174 o.: Ecomectin paszta reklámképe: MOBSTERS DREAM Amerikai Quarter Horse fajtájú fedezőmén

Tulajdonosa: Dr. Filipzné Istenes Csilla & Dr. Filipsz István